

# ЕГЭ 2013

## Математика

**C1**

И. Н. Сергеев  
В. С. Панферов

**C2**

## Задача С3

**C3**

Уравнения  
и неравенства

**C4**

**C5**

**C6**

Под редакцией  
А. Л. Семёнова и И. В. Ященко

**ФГОС**

Разработано МИОО

И. Н. Сергеев, В. С. Панфёров

# ЕГЭ 2013. Математика

## Задача С3

### Уравнения и неравенства

Издание четвертое, стереотипное

Под редакцией А. Л. Семенова и И. В. Ященко

Издание соответствует новому Федеральному государственному  
общеобразовательному стандарту (ФГОС)

Москва  
Издательство МЦНМО  
2013

УДК 373:51  
ББК 22.1я72  
C32

**Сергеев И. Н., Панфёров В. С.**

C32      ЕГЭ 2013. Математика. Задача С3. Уравнения и неравенства / Под ред. А. Л. Семенова и И. В. Ященко. — 4 изд., стереотип. — М.: МЦНМО, 2013. — 80 с.

ISBN 978-5-4439-0487-0

Пособия по математике серии «ЕГЭ 2013» ориентированы на подготовку учащихся старшей школы к успешной сдаче единого государственного экзамена по математике. В данном учебном пособии представлен материал для подготовки к решению задачи С3.

Книга посвящена решению уравнений и неравенств. В ней рассмотрены и прокомментированы все основные типы уравнений и неравенств, соответствующие школьной программе по математике. Предложены различные методы их решения, которые применимы и к другим задачам ЕГЭ 2013 г.: типа С (С1, С5, С6) и типа В (В5, В7, В12, В13, В14). Кроме того, в книге собраны воедино необходимые справочные сведения по каждой теме, даны диагностические работы разного уровня, предложены задачи для самостоятельного решения, а также приведён список литературы для подготовки к экзамену.

На различных этапах обучения пособие поможет обеспечить уровневый подход к организации повторения, осуществить контроль и самоконтроль знаний по алгебре и началам анализа.

Пособие предназначено для учащихся старшей школы, учителей математики, родителей.

Издание соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному стандарту (ФГОС).

ББК 22.1я72

*Приказом № 729 Министерства образования и науки Российской Федерации Московский центр непрерывного математического образования включен в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе.*

ISBN 978-5-4439-0487-0

© Сергеев И. Н., Панфёров В. С., 2013.  
© МЦНМО, 2013.

## Предисловие

Пособие продолжает серию учебных пособий по математике под редакцией А. Л. Семенова и И. В. Ященко, посвященных подготовке к ЕГЭ по математике в 2013 г.

При решении практически любой математической задачи приходится производить преобразования числовых, алгебраических или функциональных выражений. И хотя сами эти преобразования не являются самоцелью, они представляют собой довольно эффективное средство (причём иногда — чуть ли не единственно возможное) для решения задачи.

Сказанное особенно относится к задачам на решение уравнений или неравенств. Именно таким задачам и посвящена настоящая книга, в которой рассмотрены основные типы уравнений и неравенств, а также различные методы их решений.

Читателю предлагаются несколько наборов диагностических задач. Каждый такой набор включает в себя рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические, содержащие модули (абсолютные величины) и комбинированные уравнения и неравенства. Начальная диагностическая работа содержит задачи, которые разбираются далее в каждом параграфе. Уровень сложности задач следующих шести диагностических работ возрастает с ростом номера работы.

В каждом параграфе приведены задачи для самостоятельного решения (тренировочные и подготовительные). В случае возникновения непреодолимых трудностей при решении каких-либо задач переходите к более простым, подготовительным задачам по соответствующей теме. После этого снова возвращайтесь к тренировочным задачам. В конце книги имеется список литературы для самостоятельной подготовки к экзамену.

Наши рекомендации таковы:

— выполните диагностическую работу и сверьте полученные Вами ответы с ответами в конце книги — каждая нерешенная задача и каждый неверный ответ является для вас сигналом к действию;

— внимательно прочитайте предложенные методические рекомендации и примеры решений всех задач диагностической работы, сравнив их с текстами ваших решений и обратив особое внимание на имеющиеся различия между ними;

— последовательно решайте диагностические работы 1—6 (расположенные в порядке возрастания трудности задач), перемежая их

с тренировочными и диагностическими задачами — прежде всего по тем темам, которые вызывают наибольшие затруднения.

Надеемся, что навыки решения задач, предлагаемых в настоящей книге, помогут школьникам в будущем успешно сдавать самые разные экзамены по математике.

Работа над изданием выполнена при поддержке Российского гуманитарного фонда, проект № 08-06-000144а.

Авторы благодарны А. В. Семёнову, прочитавшему всю рукопись, сделавшему ряд содержательных замечаний и предложений, улучшающих текст в целом.

В подготовке настоящего издания большую помощь авторам оказали студенты механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова А. Трепалин, А. Годнева, О. Заплетина, И. Нетай, которые прорешали все задачи и выверили ответы к ним.

Авторы благодарны всем, кто сообщил об опечатках и прислал замечания к первому изданию.

*И. Н. Сергеев, В. С. Панфёров*

## **Введение**

Первая часть (часть В) варианта ЕГЭ по математике представлена задачами с кратким ответом, вторая часть (часть С) состоит из шести задач с развернутым ответом.

Основной целью этой, так сказать, «вузовской» части варианта (в отличие от первой его части, носящей характер «зачета» по курсу математики средней школы) является дифференциация выпускников в отношении их возможностей дальнейшего обучения в вузах с различными требованиями к математической подготовке учащихся.

Задания всей части 2 в целом предназначены для проверки знаний на том уровне требований, который традиционен в вузах с профильным экзаменом по математике.

Итогом работы выпускника над каждой задачей типа С является представленные им на экзамене:

- ответ на поставленный в задании вопрос;
- текст решения задачи.

По большому счету, ответ к задаче также можно считать неотъемлемой частью ее *решения* (в широком смысле), что мы и подразумеваем в дальнейшем. Решение записывается в специальный бланк ответов № 2, выдаваемый выпускнику непосредственно на экзамене.

За решение задачи С3 на экзамене можно получить оценку в 0, 1, 2 или 3 балла. Не максимальное количество баллов за задачу ставится в том случае, если в ее решении присутствуют ошибки, неточности или недостатки обоснования. Подчеркнем, что на экзамене оценивание решения задачи должно производиться в строгом соответствии с заранее утвержденными *критериями*.

Далеко не праздным является вопрос о том, *какие способы решения задачи и записи ее ответа допустимы на едином государственном экзамене*. Главным требованием к решению была и остается его *математическая правильность*, а именно:

- в ответ необходимо включить только верные значения искомой величины, причем все;
- форма записи ответа может быть любой из употребляемых в современной учебной литературе;
- текст решения должен служить реальным обоснованием (точнее, доказательством) правильности полученного ответа;
- при решении задачи любого содержания приемлемы любые математические методы — алгебраические, функциональные, графические, геометрические, логические, комбинаторные и т.д.;

• рациональность решения, равно как и его нерациональность, на экзамене во внимание не принимается.

Начиная с 2010 года, модель оценивания решений задач части С значительно изменена.

Новые критерии оценки основываются на следующих принципах:

- Проверяется только математическое содержание представленного решения; погрешности его оформления не являются поводом для снижения оценки.

- Ответ может быть записан в любом виде; оценивается не форма записи ответа, а его правильность.

- Степень подробности обоснований в решении должна быть разумно достаточной; претензии к решению, связанные с отсутствием ссылок на правомерно используемые стандартные факты и правила (как-то: формулы сокращённого умножения, формула корней квадратного уравнения, действия со степенями или логарифмами, свойства неравенств и многие-многие другие), не предъявляются.

- Решение задачи, в котором обоснованно получен правильный ответ, оценивается максимальным числом баллов.

- Наличие правильного ответа при полном отсутствии текста решения оценивается в ноль баллов.

- Некоторые погрешности решений, не оказавшие существенного влияния на его обоснованность и принципиальную правильность, могут расцениваться как описки и не приводить к снижению оценки.

- Если на каком-либо этапе решения допущена грубая ошибка, то другие его этапы, проведенные в работе правильно, могут быть, тем не менее, оценены положительно, в соответствии с критериями.

- При определении итоговой оценки решения выбирается максимально возможное число баллов, которое можно выставить за него в соответствии с утвержденными критериями.

- При проверке оригинальных или нестандартных решений на экзамене вырабатываются частные критерии их оценки, соответствующие (аналогичные) общим.

Подготовка к предлагаемой форме экзамена по математике состоит *не в натаскивании* выпускника на какие-то определенные типы задач, а в систематическом и обстоятельном изучении самого предмета как на уроках в школе, так и в процессе самостоятельной работы ученика.

При подготовке к тренировочным и подготовительным заданиям нужно учесть следующие три аспекта.

- Во-первых, единый государственный экзамен в целом опирается, конечно же, на *школьную программу*. Поэтому уверенное знание

программы по математике и хорошее владение ею — необходимое условие успешной сдачи ЕГЭ. Эта программа в основном определена и подкреплена огромным количеством самых разнообразных учебников. Однако среди обилия учебников по математике советуем выбирать те, что отличаются большей глубиной проникновения в излагаемый материал и рассчитаны на более вдумчивого учащегося. Эти качества учебников способны в перспективе оказать экзамененному существенную помощь.

- Во-вторых, чтобы подготовиться к какому-либо экзамену, вообще, нужно, для начала, изучить *историю вопроса*, а именно: узнать, какие задачи давались на экзамене в прошлые годы, какими методами предполагалось их решать, каковы были требования к их оформлению и т. п. Кроме того, следует сделать поправку на новые критерии оценивания, для чего имеет смысл внимательно изучить демоверсию предстоящего экзамена, доступные пробные или тренировочные варианты, а также другие материалы, дающие более полное представление о будущих задачах.

- В-третьих, желательно иметь некоторый запас прочности, т. е. знать и уметь несколько больше того минимума, который вытекает из опыта предыдущих экзаменов. Ведь не секрет, что варианты экзаменационных заданий постепенно развиваются и усложняются: то, что раньше казалось новым и трудным для восприятия, со временем становится привычным и элементарным. В общем, нельзя ориентироваться только на вчерашний день. А учитывая, что ожидаемые в 2013 году задачи типа С будут в значительной мере опираться на опыт вступительных экзаменов, хорошо бы приобрести и проработать современные пособия для поступающих в вузы, содержащие грамотные подборки задач и возможных методов их решения.

## Диагностическая работа

1. Решите неравенство  $\frac{2x^2 - 3x - 5}{x^2 - 3x + 3} \leq 0$ .

2. Решите неравенство  $\frac{2x^2 - 3x}{x^2 + 2x - 3} \geq \frac{x}{4}$ .

3. Решите неравенство  $0,1^{x^2+4x} < 10000$ .

4. Решите неравенство

$$\frac{x^4 - 16}{4 \cdot 2^{8-x^2} - 8^x} \leq 0.$$

5. Решите неравенство  $\log_{\sqrt{3}}(x^2 - 2x - 5) \geq 2$ .

6. Решите неравенство

$$\log_{x+2}(7x^2 - x^3) + \log_{(x+2)^{-1}}(x^2 - 3x) \geq \log_{\sqrt{x+2}} \sqrt{5} -$$

7. Решите уравнение  $\sqrt{x-1} = 3 - x$ .

8. Решите неравенство  $\frac{\sqrt{x^2 - 1} - 2\sqrt{1-x}}{\sqrt{x+7}-1} \leq 0$ .

9. Решите уравнение  $|x-1| + 2|x-3| = 5 - x$ .

10. Решите неравенство  $2|x-2| - 3 < x+4$ .

11. Решите неравенство  $x(|x^2 - 1| - 2|x-1|) < 0$ .

12. Найдите все корни уравнения

$$\sin 2x - 3 = 3 \cos 2x$$

на промежутке  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ .

13. Решите уравнение

$$\sqrt{6 \sin x + 2 \cos x} = 0.$$

14. Решите неравенство

$$10^{x \lg x} \cdot 10^{\sqrt{10} \lg^2 x} < 1000000.$$

15. Решите уравнение

$$3^{3-2x} - \log_2(2-3x) = 3^{2-3x} - \log_2(3-2x).$$

**16.** Решите неравенство

$$5^{2x^2-2x+1} \leq \sqrt{3 \sin\left(\pi x - \arctg \frac{4}{3}\right) + 4 \cos\left(\pi x - \arctg \frac{4}{3}\right)}.$$

**17.** Решите систему

$$\begin{cases} 2^x + 2^{2-x} \geq 3 \cdot 2^{0,5}, \\ \log_3 x + \log_{0,5} x < 1. \end{cases}$$

## § 1. Рациональные уравнения и неравенства

Всякое уравнение или неравенство относительно неизвестной  $x$  записывается в виде

$$f(x) \vee g(x),$$

где  $f(x)$  и  $g(x)$  — некоторые выражения<sup>1</sup>, зависящие от переменной  $x$ , а  $\vee$  — здесь и всюду ниже один из знаков  $=, <, >, \leqslant, \geqslant, \neq$ .

К простейшим рациональным уравнениям и неравенствам можно отнести, во-первых, **линейное**

$$ax + b \vee 0,$$

решаемое стандартными преобразованиями, и, во-вторых, **квадратное**

$$ax^2 + bx + c \vee 0 \quad (a \neq 0),$$

левая часть которого представляет собой **квадратный трёхчлен**  $f(x)$ .

Пара корней квадратного уравнения задаётся формулой

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Обычно в этой формуле корни обозначаются  $x_{1,2}$ , но тогда не ясно, какой из них соответствует знаку «плюс», а какой — знаку «минус». Этим числам разрешается и совпадать: в этом случае квадратное уравнение формально имеет только один корень<sup>2</sup>.

Для решения же квадратного неравенства бывает полезно:

- разложить его левую часть на линейные множители, т. е. привести её к виду

$$f(x) = a(x - x_+)(x - x_-);$$

- применить следующее основное утверждение о знаке квадратного трёхчлена: пусть

$$a > 0,$$

тогда неравенство

$$f(x) < 0$$

выполнено между корнями, а неравенство

$$f(x) > 0$$

выполнено за корнями.

---

<sup>1</sup>Функции.

<sup>2</sup>А квадратный трёхчлен — по-прежнему два.

Здесь предполагается, что подкоренное выражение, фигурирующее в формуле корней квадратного трёхчлена и называемое его **дискриминантом**, принимает неотрицательное значение. В противном случае — корней нет, разложение на линейные множители не возможно, а квадратный трёхчлен во всех точках имеет один и тот же знак.

**Пример 1.1.** Решите неравенство

$$\frac{2x^2 - 3x - 5}{x^2 - 3x + 3} \leq 0.$$

**Решение<sup>1</sup>.**

$$\frac{2x^2 - 3x - 5}{x^2 - 3x + 3} \leq 0,$$

$$(x - 2,5)(x + 1) \leq 0, \quad \text{так как } x^2 - 3x + 3 > 0 \quad (D < 0).$$

*Ответ:*  $-1 \leq x \leq 2,5$ .

Основным способом решения неравенства

$$f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \dots \cdot f_n(x) \vee 0,$$

левая часть которого представляет собой произведение, а правая — равна нулю, считается *перебор* всех таких случаев знаков сомножителей  $f_i(x)$ , при которых произведение имеет требуемый в неравенстве знак.

**Метод интервалов** применяется для решения *рациональных* неравенств, приведённых к *стандартному* виду

$$(x - x_1)^{k_1}(x - x_2)^{k_2} \dots (x - x_n)^{k_n} \vee 0,$$

где  $k_1, k_2, \dots, k_n$  — целые числа<sup>2</sup>. Он позволяет организованно исследовать знак произведения, стоящего в левой части неравенства, опираясь на следующее рассуждение:

- точки  $x_1, x_2, \dots, x_n$  разбивают числовую ось на промежутки<sup>3</sup>, на каждом из которых произведение имеет *фиксированный* знак;
- на самом *правом* из получившихся промежутков произведение *заведомо положительно*, так как на нём положителен каждый из его сомножителей;

<sup>1</sup> В тексте приводимых нами решений всюду между двумя последовательными уравнениями, неравенствами, системами или совокупностями подразумевается знак равносильности.

<sup>2</sup> Возможно, и отрицательные — тогда соответствующие множители с самого начала стоят в знаменателе.

<sup>3</sup> *Интервалы*, отсюда и название метода.

- далее, если двигаться по числовой оси справа налево, то при переходе через очередной корень  $x_i$  меняет знак множитель  $x - x_i$  и только он, поэтому знак произведения либо меняется — когда соответствующая степень  $k_i$  нечётна, либо не меняется — когда она чётна;
- наконец, для завершения исследования достаточно выяснить, в каких точках  $x_i$  произведение равно нулю, а в каких — не имеет смысла, что определяется знаком степени  $k_i$ .

**Пример 1.2.** Решите неравенство

$$\frac{2x^2 - 3x}{x^2 + 2x - 3} \geq \frac{x}{4}.$$

Решение.

$$\frac{2x^2 - 3x}{x^2 + 2x - 3} \geq \frac{x}{4},$$

$$\frac{x^3 - 6x^2 + 9x}{x^2 + 2x - 3} \leq 0,$$

$$\frac{x(x-3)^2}{(x+3)(x-1)} \leq 0.$$



Ответ:  $x < -3, 0 \leq x < 1, x = 3$ .

При преобразованиях выражений и, в частности, при разложении их на множители иногда помогают формулы сокращённого умножения:

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 — \text{квадрат суммы};$$

$$(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 — \text{квадрат разности};$$

$$(x+y)(x-y) = x^2 - y^2 — \text{разность квадратов};$$

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 — \text{куб суммы};$$

$$(x-y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 — \text{куб разности};$$

$$(x+y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3 — \text{сумма кубов};$$

$$(x-y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3 — \text{разность кубов}.$$

## Тренировочные задачи

*Решите следующие уравнения и неравенства:*

1.  $x^2 - 2010x + 2009 = 0.$
2.  $x^2 + 2010x - 2011 = 0.$
3.  $x^2 + 2011x + 2010 = 0.$
4.  $x^2 - 2010x + 2009 < 0.$
5.  $x^2 + 2010x - 2011 \leq 0.$
6.  $x^2 + 2011x + 2010 \geq 0.$
7.  $(x+1)^4 - 3(x+1)^2 - 4 = 0.$
8.  $(x+1)^4 - 3(x+1)^2 - 4 < 0.$
9.  $x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} = 0.$
10.  $x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} \leq 0.$
11.  $\frac{x^2+x+2}{3x^2+5x-14} = \frac{x^2+x+6}{3x^2+5x-10}.$
12.  $(x-4)(x-5)(x-6)(x-7) = 1680.$
13.  $(x-4)(x-5)(x-6)(x-7) < 1680.$
14.  $\frac{x^2}{3} + \frac{48}{x^2} = 10\left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x}\right).$
15.  $\frac{(2-x^2)(x-3)^2}{(x+1)(x^2-3x-4)} \geq 0.$
16.  $\frac{(x+2)(x^2-2x+1)}{4+3x-x^2} \geq 0.$
17.  $\frac{x^4-3x^3+2x^2}{x^2-x-30} > 0.$
18.  $\frac{x^2+x+1}{x^2-4x-5} < 0.$
19.  $\frac{x^2-6x+9}{5-4x-x^2} \geq 0.$
20.  $\frac{5x-x^2-4}{x^2-4x+4} \geq 0.$
21.  $\frac{x^2-3x+24}{x^2-3x+3} < 4.$
22.  $\frac{x^2+2}{x^2-1} < -2.$
23.  $\frac{3x-5}{x^2+4x-5} > \frac{1}{2}.$
24.  $\frac{5-2x}{3x^2-2x-16} < 1.$
25.  $\frac{1}{x^2-5x+6} \geq \frac{1}{2}.$
26.  $\frac{19-33x}{7x^2-11x+4} > 2.$
27.  $\frac{4}{1+x} + \frac{2}{1-x} < 1.$
28.  $\frac{1}{x-2} + \frac{2}{x-1} > \frac{1}{x}.$
29.  $\frac{7}{(x-2)(x-3)} + \frac{9}{x-3} + 1 < 0.$
30.  $\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(x+1)(x+2)(x+3)} > 1.$
31.  $(x^2+3x+1)(x^2+3x-3) \geq 5.$
32.  $(x^2-2x)(2x-2) - 9 \frac{2x-2}{x^2-2x} \leq 0.$
33.  $\frac{1}{x+6} + \frac{1}{x-2} \geq \frac{1}{x-3}.$
34.  $\frac{7}{x^2-5x+6} + \frac{9}{x-3} + 1 \leq 0.$
35.  $\frac{1}{x^2+8x-9} \geq \frac{1}{3x^2-5x+2}.$
36.  $\frac{\frac{1}{x-1}-1}{1-\frac{1}{x-7}} \geq 0.$
37.  $\left(-\frac{x}{2} + \frac{5}{8} - \frac{15}{88-32x}\right)^2 \geq 1.$

**Подготовительные задачи**

*Решите следующие уравнения и неравенства:*

1.  $3x^2 - 7x + 4 = 0.$
2.  $3x^2 - 7x + 4 \leq 0.$
3.  $3x^2 - 7x + 6 = 0.$
4.  $3x^2 - 7x + 6 > 0.$
5.  $3x^2 - 7x - 6 = 0.$
6.  $3x^2 - 7x - 6 > 0.$
7.  $3x^4 - 7x^2 + 4 = 0.$
8.  $3x^4 - 7x^2 + 4 < 0.$
9.  $3x^4 - 7x^2 - 6 = 0.$
10.  $3x^4 - 7x^2 - 6 \leq 0.$
11.  $3x^6 - 7x^3 - 6 = 0.$
12.  $3x^6 - 7x^3 - 6 > 0.$
13.  $(x-1)(3-x)(x-2)^2 > 0.$
14.  $\frac{(x-1)(x+2)^2}{-x-1} < 0.$
15.  $\frac{x^2+4x+4}{2x^2-x-1} > 0.$
16.  $\frac{5x-4}{3x+1} < 0.$
17.  $\frac{2x-3}{3x-5} > 0.$
18.  $\frac{0,7}{x-1-x^2} < 0.$
19.  $\frac{x^2-6x+8}{x^2+x+1} \geq 0.$
20.  $\frac{3}{x-2} < 1.$
21.  $\frac{1}{x-1} \leq 2.$
22.  $\frac{x-1}{x+3} > 2.$
23.  $\frac{5x-1}{x^2+3} < 1.$
24.  $\frac{x+1}{(x-1)^2} < 1.$
25.  $\frac{3x^2+1}{x^2-5x+6} \geq 0.$
26.  $\frac{2x^2-21x+40}{x^2+3} \geq 0.$
27.  $\frac{2x^2-3x-459}{x^2+1} > 1.$
28.  $\frac{x}{x^2-3x-4} > 0.$
29.  $\frac{x+7}{x-5} + \frac{3x+1}{2} \geq 0.$
30.  $\frac{x-1}{x+1} < x.$
31.  $\frac{1}{x+2} < \frac{3}{x-3}.$
32.  $2 + \frac{3}{x+1} > \frac{2}{x}.$
33.  $1 + \frac{12}{x^2} < \frac{7}{x}.$
34.  $x - 17 \geq \frac{60}{x}.$
35.  $\frac{6}{x-5} \geq x.$
36.  $x - 1 > \frac{4x}{3-x}.$
37.  $\frac{3}{2-x^2} \leq 1.$
38.  $\frac{1}{x+2} \geq \frac{1}{x-2}.$
39.  $\frac{x^2+1}{x} < \frac{1}{x} + 1.$
40.  $\frac{9}{(x+1)^2} \geq 1.$

## § 2. Показательные уравнения и неравенства

Стандартный способ решения *простейших показательных* уравнений и неравенств основывается на монотонности показательной функции, из которой получается следующее основное *правило отбрасывания оснований*<sup>1</sup>: пусть

$$a > 1,$$

тогда уравнение или неравенство

$$a^f \vee a^g$$

равносильно уравнению или неравенству

$$f \vee g.$$

В этом правиле последнее уравнение или неравенство имеет тот же знак  $\vee$ , что и первое, так как показательная функция с основанием  $a > 1$  возрастает.

Если же основание  $a$  удовлетворяет неравенствам  $0 < a < 1$ , то в сформулированный переход необходимо внести поправку, поменяв в конце знак  $\vee$  на *обратный*  $\wedge$ , а именно: знак  $>$  — на  $<$ , знак  $\geq$  — на  $\leq$  и т. д., но знак  $=$  (как и знак  $\neq$ ) при этом не меняется вовсе. Всё дело в том, что показательная функция с основанием, меньшим единицы, уже не возрастает, а убывает.

Когда основание степени не является константой, может случиться, что при одних значениях неизвестной<sup>2</sup> оно больше единицы, а при других — меньше. И если это так, то каждый из перечисленных случаев разбирается отдельно<sup>3</sup>.

В уравнении или неравенстве

$$a^f \vee b \quad (a, b > 0, a \neq 1),$$

левая часть которого уже имеет нужный вид, а правая — нет, положение можно поправить с помощью тождества<sup>4</sup>

$$b = a^{\log_a b}.$$

Оно же позволяет в случае переменного основания перейти к новому, заранее выбранному, постоянному основанию.

<sup>1</sup> То есть логарифмирование уравнения или неравенства.

<sup>2</sup> Или параметра.

<sup>3</sup> А при необходимости разбираются также и случаи, когда основание равно нулю или даже отрицательно.

<sup>4</sup> Представляющего собой, по существу, определение логарифма.

**Пример 2.1.** Решите неравенство

$$0,1^{x^2+4x} < 10000.$$

**Решение.**

$$0,1^{x^2+4x} < 10000 \quad (= 0,1^{-4});$$

$$x^2 + 4x > -4;$$

$$(x+2)^2 > 0;$$

$$x \neq -2.$$

*Ответ:*  $x < -2, x > -2$ .

Для приведения исходного показательного уравнения или неравенства к нужному виду могут пригодиться следующие формулы действий со степенями (здесь и ниже считаем  $a, b > 0$ ):

$$a^0 = 1, \quad 1^x = 1;$$

$$a^{\frac{k}{n}} = \sqrt[n]{a^k} \quad (k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N});$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x};$$

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y};$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y};$$

$$(a^x)^y = a^{xy};$$

$$a^x \cdot b^x = (ab)^x;$$

$$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x.$$

К неравенствам вида

$$(a^f - a^g) \cdot h \vee 0$$

применим **метод замены множителя**, позволяющий сильно упростить выражение в скобках и состоящий в следующем: пусть

$$a > 1,$$

тогда множитель

$$a^f - a^g$$

можно заменить множителем

$$f - g$$

того же знака.

При указанной замене сохраняется каждое из трёх возможных событий: положительность множителя, его отрицательность и равенство его нулю. По сути, этот метод представляет собой перефразировку сформулированного выше правила отбрасывания оснований, а в случае  $0 < a < 1$  тот же множитель  $a^f - a^g$  можно заменить противоположным множителем  $g - f$ .

**Пример 2.2.** Решите неравенство

$$\frac{x^4 - 16}{4 \cdot 2^{8-x^2} - 8^x} \leq 0.$$

Решение.

$$\frac{x^4 - 16}{4 \cdot 2^{8-x^2} - 8^x} \leq 0,$$

$$\frac{(x^2 + 4)(x^2 - 4)}{2^{10-x^2} - 2^{3x}} \leq 0,$$

$$\frac{x^2 - 4}{(10 - x^2) - 3x} \leq 0 \quad (\text{так как } 2^f - 2^g \text{ и } f - g \text{ — одного знака}),$$

$$\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+5)} \geq 0,$$

$$\begin{cases} \frac{x+2}{x+5} \geq 0, \\ x \neq 2. \end{cases}$$

Ответ:  $x < -5, -2 \leq x < 2, x > 2$ .

Заметим, что полученное выше неравенство

$$\frac{(x^2 + 4)(x^2 - 4)}{2^{10-x^2} - 2^{3x}} \leq 0$$

можно было решить и без замены множителя, рассмотрев два случая:

$$1) \begin{cases} x^2 \geq 4, \\ 2^{10-x^2} < 2^{3x}; \end{cases} \quad \begin{cases} (x-2)(x+2) \geq 0, \\ (x-2)(x+5) > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2 \\ x < -5; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x^2 \leq 4, \\ 2^{10-x^2} > 2^{3x}; \end{cases} \quad \begin{cases} (x-2)(x+2) \leq 0, \\ (x-2)(x+5) < 0; \end{cases} \quad -2 \leq x < 2.$$

## Тренировочные задачи

Решите следующие уравнения и неравенства:

$$1. \frac{2^{2x-1} \cdot 4^{x+1}}{8^{x-1}} = \left(\frac{1}{64}\right)^{-1}.$$

$$2. 25(0,2)^{x+0,5} = \sqrt{5}(0,04)^x.$$

$$3. 4^{\frac{2}{x}} - 5 \cdot 4^{\frac{1}{x}} + 4 = 0.$$

$$4. 64 \cdot 9^x - 84 \cdot 12^x + 27 \cdot 16^x = 0.$$

$$5. 4^{-\frac{1}{x}} + 6^{-\frac{1}{x}} = 9^{-\frac{1}{x}}.$$

$$6. 3^{2x-3} - 9^{x-1} + 27^{\frac{2x}{3}} = 675.$$

$$7. 5^{2x} - 7^x - 35 \cdot 5^{2x} + 35 \cdot 7^x = 0.$$

$$8. 8^x - 3 \cdot 4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0.$$

$$9. 32^{\frac{x+5}{x-7}} = 0,25 \cdot 128^{\frac{x+17}{x-3}}.$$

$$10. (2 + \sqrt{3})^x + (2 - \sqrt{3})^x = 4.$$

$$11. (\sqrt{5 + \sqrt{24}})^x + (\sqrt{5 - \sqrt{24}})^x = 10.$$

$$12. 3^{12x-1} - 9^{6x-1} - 27^{4x-1} + 81^{3x+1} = 2192.$$

$$13. \left(\frac{4}{9}\right)^{\sqrt{x}} = 2,25^{\sqrt{x}-4}.$$

$$14. 2^{x^2-6} \cdot 3^{x^2-6} = \frac{(6^{x-1})^4}{6^5}.$$

$$15. \left(\frac{4}{9}\right)^x \cdot \left(\frac{27}{8}\right)^{x-1} = \frac{\lg 4}{\lg 8}.$$

$$16. 5^x \cdot 8^{\frac{x-1}{x}} = 500.$$

$$17. 0,3^{2x^2-3x+6} < 0,00243.$$

$$18. 0,1^{4x^2-2x-2} < 0,1^{2x-3}.$$

$$19. 4^{-x+0,5} - 7 \cdot 2^{-x} - 4 < 0.$$

$$20. 4^{x+1} - 16^x < 2 \cdot \log_4 8.$$

$$21. \frac{2^{x-1} - 1}{2^{x+1} + 1} < 2.$$

$$22. \frac{2^{1-x} - 2^x + 1}{2^x - 1} \leq 0.$$

$$23. 2^{x+2} - 2^{x+3} - 2^{x+4} > 5^{x+1} - 5^{x+2}.$$

$$24. 4^x - 2 \cdot 5^{2x} - 10^x > 0.$$

$$25. 9 \cdot 4^{-\frac{1}{x}} + 5 \cdot 6^{-\frac{1}{x}} < 4 \cdot 9^{-\frac{1}{x}}.$$

$$26. 8 \cdot \frac{3^{x-2}}{3^x - 2^x} > 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^x.$$

$$27. \frac{11 \cdot 3^{x-1} - 31}{4 \cdot 9^x - 11 \cdot 3^{x-1} - 5} \geq 5.$$

$$28. 2^{3x-0,5} + \frac{\sqrt{2}}{2} > 1 + 2^{-3x}.$$

$$29. 4^{3x^2+x} - 8 < 2 \cdot 8^{x^2+\frac{x}{3}}.$$

$$30. 5^{2x-\frac{x^2}{3}} < 5^{2-2x} (\sqrt[3]{5})^{x^2} + 24.$$

$$31. 5^{x+2} - 5^{x+1} - 5^x > 7^{\frac{x}{2}+3} + 7^{\frac{x}{2}+2} + 7^{\frac{x}{2}+1}.$$

$$32. 5^{2x+1} + 6^{x+1} > 30 + 5^x \cdot 30^x.$$

**Подготовительные задачи**

*Решите следующие уравнения и неравенства:*

1.  $5^{x^2-6x+8}=1.$

15.  $4^x = 2 \cdot 14^x + 3 \cdot 49^x.$

2.  $\left(\frac{2}{5}\right)^{3x-7} = \left(\frac{5}{2}\right)^{7x-3}.$

16.  $2^{5-10x} > 1.$

3.  $0,125 \cdot 2^{4x-16} = \left(\frac{0,25}{\sqrt{2}}\right)^{-x}.$

17.  $16^x > 0,125.$

4.  $5^{x+1} = 5^{x-1} + 24.$

18.  $0,5^x > \frac{1}{128}.$

5.  $7^{x+1} + 7^x = 3^{x+2} + 3^{x+1} + 3^x.$

19.  $3^{x+1} < \frac{9^{4x^2}}{\sqrt{27}}.$

6.  $5^{2x-1} + 5^{x+1} = 250.$

20.  $0,2^{\frac{2x-3}{x-2}} > 5.$

7.  $9^x + 6^x = 2 \cdot 4^x.$

21.  $0,1^{\frac{2x+1}{1-x}} > 10^3.$

8.  $2^{2+x} + 2^{2-x} = 17.$

22.  $2^{x+2} - 2^{x+1} + 2^{x-1} - 2^{x-2} \leq 9.$

9.  $2^{x+1} \cdot 5^x = 200.$

23.  $2^x + 2^{1-x} - 3 < 0.$

10.  $2^x \cdot 5^{x-1} = 10^x \cdot 5^{x+1}.$

24.  $5^{2x+1} > 5^x + 4.$

11.  $2^{3-2x} = 4^{3x+1-x^2}.$

25.  $25^{-x} - 5^{-x+1} \geq 50.$

12.  $3^{2x} - 5^x - 9^x \cdot 15 + 5^x \cdot 15 = 0.$

26.  $3^{x-3} < \frac{3}{27^{\frac{1}{x}}}.$

13.  $7^{x+2} - \frac{1}{7}7^{x+1} - 14 \cdot 7^{x-1} + 2 \cdot 7^x = 48.$

27.  $4^{\frac{2x-2}{x}} < \sqrt[3]{8^{3x-9}}.$

14.  $4 \cdot 2^{2x} - 6^x = 18 \cdot 3^{2x}.$

### § 3. Логарифмические уравнения и неравенства

Стандартный метод решения *простейших логарифмических уравнений и неравенств*, изучаемых в школе, опирается на монотонность логарифмической функции, т. е. на следующее основное *правило отбрасывания логарифмов*<sup>1</sup>: пусть  $a > 1$ , тогда уравнение или неравенство

$$\log_a f \vee \log_a g$$

равносильно системе

$$\begin{cases} f \vee g \\ f, g > 0. \end{cases}$$

Отличие этого правила от аналогичного правила отбрасывания оснований объясняется тем, что при отбрасывании логарифмов расширяется *область допустимых значений*<sup>2</sup> (ОДЗ) уравнения или неравенства. Действительно, выражения  $f$  и  $g$ , стоявшие прежде под логарифмами, после отбрасывания последних могут стать отрицательными или равными нулю, каковые возможности следует сознательно отнести.

Для этого в систему с полученным уравнением или неравенством можно добавить оба пропавших ограничения на  $f$  и  $g$ . При этом, как правило, одно из них<sup>3</sup> оказывается логически лишним, что позволяет значительно упростить получающуюся систему, сэкономив на нахождении ОДЗ.

В случае  $0 < a < 1$ , неравенстве  $f \vee g$  итоговой системы необходимо заменить неравенством  $f \wedge g$ , так как логарифмическая функция с таким основанием  $a$  убывает.

Если же основание логарифма не есть константа, то отдельно разбираются случаи, когда оно больше единицы и когда — меньше<sup>4</sup>.

Для того чтобы отбросить логарифмы в уравнении или неравенстве

$$\log_a f \vee g,$$

---

<sup>1</sup> То есть потенцирование уравнения или неравенства.

<sup>2</sup> Или область определения.

<sup>3</sup> А иногда и оба.

<sup>4</sup> Случаи, когда основание равно единице, нулю или вообще отрицательно, — невозможны по определению логарифма.

его правую часть можно представить в нужном виде с помощью тождества<sup>1</sup>

$$g = \log_a(a^g).$$

**Пример 3.1.** Решите неравенство

$$\log_{\sqrt{3}}(x^2 - 2x - 5) \geq 2.$$

**Решение.**

$$\log_{\sqrt{3}}(x^2 - 2x - 5) \geq 2 \quad (= \log_{\sqrt{3}}\sqrt{3}^2 = \log_{\sqrt{3}}3),$$

$$x^2 - 2x - 5 \geq 3,$$

$$(x - 4)(x + 2) \geq 0.$$

*Ответ:*  $x \leq -2, x \geq 4$ .

Для приведения исходного логарифмического уравнения или неравенства к нужному виду могут пригодиться следующие формулы действий с логарифмами (здесь и ниже  $a, b, x, y > 0$  и  $a, b \neq 1$ ):

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1;$$

$a^{\log_a x} = x$  — основное логарифмическое тождество;

$\log_a x + \log_a y = \log_a(xy)$  — логарифм произведения;

$\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}$  — логарифм частного;

$p \log_a x = \log_a(x^p)$  — логарифм степени;

$\frac{p}{q} \log_a x = \log_{(a^q)}(x^p) \quad (q \neq 0);$

$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$  — формула перехода к новому основанию;

$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}.$

В случае переменного основания логарифма можно избавиться от явного перебора случаев, перейдя<sup>2</sup> к новому, постоянному основанию.

Некоторые формулы из приведённого списка обладают тем свойством, что при их использовании слева направо ОДЗ уравнения или неравенства расширяется<sup>3</sup>, а в другую сторону — сужается. И если

<sup>1</sup> Представляющего собой, по большому счёту, ещё одну разновидность определения логарифма.

<sup>2</sup> По соответствующей формуле.

<sup>3</sup> Так же как и при отбрасывании логарифмов.

первую ситуацию легко исправить добавлением пропавших ограничений в систему или проверкой их выполнения для найденных решений, то вторая ситуация совершенно недопустима, так как может привести к потере решений.

К неравенствам вида

$$(\log_a f - \log_a g) \cdot h > 0$$

также применим **метод замены множителя**: пусть

$$a > 1,$$

тогда множитель

$$\log_a f - \log_a g$$

можно заменить множителем

$$f - g$$

того же знака при дополнительных условиях

$$f, g > 0.$$

Важный частный случай этой замены получается при подстановке в ней  $g = 1$ : пусть

$$a > 1,$$

тогда множитель

$$\log_a f$$

можно заменить множителем

$$f - 1 \quad \text{при } f > 0.$$

Опять же, в случае  $0 < a < 1$  множитель  $\log_a f - \log_a g$  можно заменить противоположным множителем  $g - f$  при  $f, g > 0$ , а множитель  $\log_a f$  — противоположным множителем  $1 - f$  при  $f > 0$ .

**Пример 3.2.** Решите неравенство

$$\log_{x+2}(7x^2 - x^3) + \log_{(x+2)^{-1}}(x^2 - 3x) \geq \log_{\sqrt{x+2}} \sqrt{5-x}.$$

Решение.

$$\log_{x+2}(7x^2 - x^3) + \log_{(x+2)^{-1}}(x^2 - 3x) \geq \log_{\sqrt{x+2}} \sqrt{5-x};$$

$$\log_{x+2}(7x^2 - x^3) - \log_{x+2}(x^2 - 3x) \geq \log_{x+2}(5-x);$$

$$\frac{\lg(7x^2 - x^3)}{\lg(x+2)} - \frac{\lg(x^2 - 3x) + \lg(5-x)}{\lg(x+2)} \geq 0;$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\lg(7x^2 - x^3) - \lg(x^2 - 3x)(5 - x)}{\lg(x + 2) - \lg 1} \geq 0, \\ 5 - x > 0; \\ \frac{(7x^2 - x^3) - (x^2 - 3x)(5 - x)}{(x + 2) - 1} \geq 0, \\ x < 5, \\ 7x^2 - x^3 > 0, \\ x^2 - 3x > 0, \\ x + 2 > 0 \end{array} \right.$$

(так как  $\lg f - \lg g$  и  $f - g$  — одного знака при  $f, g > 0$ );

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x(x - 15)}{x + 1} \leq 0, \\ x < 5, \\ x^2(x - 7) < 0, \\ x(x - 3) > 0; \\ x < 5, \\ \frac{x}{x + 1} \geq 0, \\ x(x - 3) > 0. \end{array} \right.$$

*Ответ:*  $-2 < x < -1, 3 < x < 5$ .

Данное неравенство можно было решить, не делая замены множителя, следующим образом:

$$\left\{ \begin{array}{l} \log_{x+2}(7x^2 - x^3) \geq \log_{x+2}(x^2 - 3x)(5 - x), \\ 5 - x \geq 0. \end{array} \right.$$

Рассмотрим два случая:

$$1) \left\{ \begin{array}{l} x + 2 > 1, \\ 7x^2 - x^3 \geq (x^2 - 3x)(5 - x), \\ x^2 - 3x > 0, \\ 5 - x > 0; \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x(x - 15) \leq 0, \\ -1 < x < 5, \\ x(x - 3) > 0; \end{array} \right. \quad 3 < x < 5;$$

$$2) \left\{ \begin{array}{l} 0 < x + 2 < 1, \\ 7x^2 - x^3 \leq (x^2 - 3x)(5 - x), \\ 7x^2 - x^3 > 0, \\ 5 - x > 0; \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x(x - 15) \geq 0, \\ -2 < x < -1, \\ x^2(x - 7) > 0; \end{array} \right. \quad -2 < x < -1.$$

## Тренировочные задачи

Решите следующие уравнения и неравенства:

1.  $\log_{(x-1)} 2 = 3$ .

2.  $\log_4(2 \log_3(1 + \log_2(1 + 3 \log_3 x))) = \frac{1}{2}$ .

3.  $(\log_2 x)^{-1} + 4 \log_2 x^2 + 9 = 0$ .

4.  $\log_{\sqrt{x}} 2 + 4 \log_4 x^2 + 9 = 0$ .

5.  $\frac{\log_8 \frac{8}{x^2}}{(\log_8 x)^2} = 3$ .

6.  $\log_{x+1}(x^2 + x - 6)^2 = 4$ .

7.  $3^{\log_3(\lg \sqrt{x})} - \lg x + \lg x^2 - 3 = 0$ .

8.  $x^{\log_{\sqrt{x}}(x-2)} = 9$ .

9.  $\log_{\frac{1}{3}} x - 3 \sqrt{\log_{\frac{1}{3}} x} + 2 = 0$ .

10.  $3 + 2 \log_{x+1} 3 = 2 \log_3(x+1)$ .

11.  $\log_x(9x^2) \cdot (\log_3 x)^2 = 4$ .

12.  $2 \log_8(2x) + \log_8(x^2 + 1 - 2x) = \frac{4}{3}$ .

13.  $\frac{3}{2} \log_{\frac{1}{4}}(x+2)^2 - 3 = \log_{\frac{1}{4}}(4-x)^3 + \log_{\frac{1}{4}}(x+6)^3$ .

14.  $2 \log_2 x - \log_{\frac{1}{2}}(13-x) = \log_2(10-x)^2 + 2 \log_4(8-x)$ .

15.  $2 \log_2(\log_2 x) + \log_{\frac{1}{2}}(\log_2(2\sqrt{2}x)) = 1$ .

16.  $\log_3((x+1)(x-3)) = 4 \log_9(2x+1) - \log_{\sqrt{5}} 5$ .

17.  $\log_{0,5}(x^2 - 5x + 6) > -1$ .

18.  $\log_8(x^2 - 4x + 3) \leq 1$ .

19.  $\log_{\frac{1}{3}} \frac{2-3x}{x} \geq -1$ .

20.  $\frac{\lg^2 x - 3 \lg x + 3}{\lg x - 1} < 1$ .

21.  $2 \log_2(x-1) - \log_2(2x-4) > 1$ .

22.  $\log_2(x-1) - \log_2(x+1) + \log_{\frac{x+1}{x-1}} 2 > 0$ .

23.  $2 \log_3 x - \log_{\frac{1}{3}}(4-x) \leq \log_3(x-1)^2 + 2 \log_9(10-x)$ .

24.  $\log_x \left( \frac{4x+5}{6-5x} \right) < -1$ .

$$25. \log_{\frac{25-x^2}{16}} \left( \frac{24-2x-x^2}{14} \right) > 1.$$

$$26. \log_{x^2}(x+2) < 1.$$

$$27. \log_{\frac{x}{2}} 8 + \log_{\frac{x}{4}} 8 < \frac{\log_2 x^4}{\log_2 x^2 - 4}.$$

$$28. \log_{\frac{1}{2}}(x+2) \cdot \log_2(x+1) > \log_{(x+2)}(x+1).$$

$$29. \log_5 x + \log_x \frac{x}{3} < \frac{2 - \log_3 x}{\log_3 x} \log_5 x.$$

$$30. \log_{\frac{1}{2}}(\log_8 \frac{x^2 - 2x}{x - 3}) < 0.$$

$$31. (\log_x 2)(\log_{2x} 2)(\log_2 4x) > 1.$$

## Подготовительные задачи

*Решите следующие уравнения и неравенства:*

1.  $\log_3(x+1) + \log_3(x+3) = 1.$
2.  $\lg 5 + \lg(x+10) = 1 + \lg(21x-20) - \lg(2x-1).$
3.  $\lg x - \frac{1}{2} \lg\left(x - \frac{1}{2}\right) = \lg\left(x + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} \lg\left(x + \frac{1}{8}\right).$
4.  $9^{\log_3(1-2x)} = 5x^2 - 5.$
5.  $x^{1+\lg x} = 10x.$
6.  $(\lg x)^2 - 3 \lg x = \lg x^2 - 4.$
7.  $(\log_2 x)^2 + 2 \log_2 \sqrt{x} = 2.$
8.  $\log_5\left(\frac{x+2}{10}\right) = \log_5\left(\frac{2}{x+1}\right).$
9.  $2 \log_4(4-x) = 4 - \log_2(-x-2).$
10.  $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) + \log_{\frac{1}{2}}(x+1) - \log_{\frac{1}{\sqrt{2}}}(7-x) = 1.$
11.  $\log_{x+1}(x^2 - 3x + 1) = 1.$
12.  $\log_2 x - 8 \log_{x^2} 2 = 3.$
13.  $1 + 2 \log_{(x+2)} 5 = \log_5(x+2).$
14.  $\log_4 2^{4x} = 2^{\log_{\sqrt{2}} 2}.$
15.  $\log_2\left(\frac{x}{4}\right) = \frac{15}{\log_2\left(\frac{x}{8}\right) - 1}.$
16.  $\log_{\frac{1}{3}}(5x-1) > 0.$
17.  $\log_5(3x-1) < 1.$
18.  $\lg(x^2 - 5x + 7) < 0.$
19.  $\log_7\left(\frac{1-2x}{x}\right) \leq 0.$
20.  $\log_{0,5}^2 x + \log_{0,5} x \leq 2.$
21.  $\log_2 x \leq \frac{2}{\log_2 x - 1}.$
22.  $\frac{1}{1+\lg x} + \frac{1}{1-\lg x} > 2.$
23.  $\log_{\frac{1}{3}}(3x-4) > \log_{\frac{1}{3}}(x-2).$
24.  $\log_{0,5}(4-x) \geq \log_{0,5} 2 - \log_{0,5}(x-1).$
25.  $\log_{0,1}(x^2 + x - 2) > \log_{0,1}(x+3).$

$$26. 1 + \log_2(x - 2) > \log_2(x^2 - 3x + 2).$$

$$27. \log_{\frac{1}{3}} [\log_4(x^2 - 5)] > 0.$$

$$28. \log_{\frac{1}{5}}(x^2 - 6x + 18) + 2 \log_5(x - 4) < 0.$$

$$29. \log_{\frac{1}{3}} x > \log_x 3 - \frac{5}{2}.$$

$$30. \log_5 \sqrt{3x+4} \cdot \log_x 5 > 1.$$

## § 4. Иррациональные уравнения и неравенства

Для избавления от радикалов в *иррациональных* уравнениях или неравенствах требуется, прежде всего, умение возводить обе их части в квадрат. Делается это с помощью следующего основного *правила возвведения в квадрат*, базирующегося на возрастании простейшей квадратичной функции на положительной полуоси: *пусть*

$$f, g \geq 0,$$

*тогда уравнение или неравенство*

$$f \vee g$$

*равносильно уравнению или неравенству*

$$f^2 \vee g^2.$$

Это правило не распространяется на те случаи, в которых хотя бы одна из частей уравнения или неравенства отрицательна, — их нужно рассматривать отдельно<sup>1</sup>.

Неосторожное введение в квадрат уравнения может повлечь за собой, к счастью, только приобретение посторонних корней, которые выявляются впоследствии с помощью проверки. Что же касается возвведения в квадрат неравенств, то тут ситуация гораздо серьёзнее: несоблюдение основного правила может привести как к приобретению, так и к потере решений — а это уже непоправимо.

**Пример 4.1.** Решите уравнение

$$\sqrt{x-1} = 3 - x.$$

**Решение.**

$$\sqrt{x-1} = 3 - x;$$

$$\begin{cases} 3 - x \geq 0, \\ x - 1 = (3 - x)^2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq 3, \\ x^2 - 7x + 10 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq 3, \\ (x - 2)(x - 5) = 0; \end{cases}$$

$$x = 2.$$

**Ответ:**  $x = 2$ .

---

<sup>1</sup> Некоторые (очевидно не реализуемые в данных условиях) — только в уме.

Преобразования иррациональных уравнений или неравенств производятся по следующим формулам действий с арифметическими корнями (здесь  $x, y \geq 0$ ,  $n, m \in \mathbb{N}$  и  $k \in \mathbb{Z}$ ):

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{1} &= 1, \quad \sqrt[n]{0} = 0; \\ (\sqrt[n]{x})^n &= x; \\ \sqrt[n]{xy} &= \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} — \text{корень из произведения}; \\ \sqrt[n]{\frac{x}{y}} &= \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \quad (y \neq 0) — \text{корень из дроби}; \\ \sqrt[n]{x^k} &= (\sqrt[n]{x})^k — \text{корень из степени}; \\ \sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} &= \sqrt[nm]{x} — \text{корень из корня}; \\ \sqrt[nm]{x^{km}} &= \sqrt[n]{x^k} — \text{правило сокращения}. \end{aligned}$$

Корни чётной степени извлекаются только из неотрицательных чисел<sup>1</sup>. Поэтому, действуя по приведённым формулам, например, с квадратными корнями, нужно аккуратно отслеживать возможное расширение ОДЗ уравнения или неравенства и, главное, не допускать её сужения.

Сказанное непосредственно относится к возведению квадратного корня  $\sqrt{f}$  в квадрат, после чего подкоренное выражение  $f$  стоит уже не под корнем, а значит, лишено неявного ограничения  $f \geq 0$ . Правда, довольно часто это ограничение сохраняется в силу других причин (например, в силу равенства бывшего подкоренного выражения  $f$  квадрату какого-либо другого выражения).

К неравенствам вида

$$(\sqrt{f} - \sqrt{g}) \cdot h \vee 0$$

также применим **метод замены множителя**, вытекающий из основного правила возведения в квадрат и состоящий в следующем: множитель

$$\sqrt{f} - \sqrt{g}$$

можно заменить множителем

$$f - g$$

того же знака при дополнительных условиях

$$f, g \geq 0.$$

<sup>1</sup> А корни нечётной степени доопределяются на любые действительные числа

Важный частный случай этой замены получается в результате подстановки в неё  $g=0$ : множитель  $\sqrt{f}$  можно заменить множителем

$$f \quad \text{при } f \geq 0.$$

**Пример 4.2.** Решите неравенство


$$\frac{\sqrt{x^2 - 1} - 2\sqrt{1-x}}{\sqrt{x+7}-1} \leq 0.$$

**Решение.**

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{x^2 - 1} - 2\sqrt{1-x}}{\sqrt{x+7}-1} \leq 0; \\ & \frac{\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{4(1-x)}}{\sqrt{x+7}-\sqrt{1}} \leq 0; \\ & \begin{cases} \frac{(x^2 - 1) - 4(1-x)}{(x+7)-1} \leq 0, \\ x^2 - 1 \geq 0, \\ 1-x \geq 0, \\ x+7 \geq 0; \end{cases} \end{aligned}$$

(так как  $\sqrt{f} - \sqrt{g}$  и  $f - g$  — одного знака при  $f, g \geq 0$ )

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \frac{x^2 + 4x - 5}{x+6} \leq 0, \\ x^2 \geq 1, \\ -7 \leq x \leq 1; \end{cases} \\ & \begin{cases} \frac{(x+5)(x-1)}{x+6} \leq 0, \\ [-7 \leq x \leq -1] \\ [x = 1]. \end{cases} \end{aligned}$$



Ответ:  $-7 \leq x < -6, -5 \leq x \leq -1, x = 1$ .

Исходное неравенство можно решить методом интервалов, применив его к иррациональной функции


$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1} - 2\sqrt{1-x}}{\sqrt{x+7}-1}.$$

1. ООФ:  $\begin{cases} x^2 - 1 \geq 0, \\ 1 - x \geq 0, \\ 1 \neq x + 7 \geq 0; \end{cases}$   $\begin{cases} x = 1, \\ -6 < x \leq -1, \\ -7 \leq x < -6. \end{cases}$

2.  $\sqrt{x^2 - 1} = 2\sqrt{1-x}; \quad x^2 - 1 = 4(1-x) \geq 0;$   $\begin{cases} (x-1)(x+5)=0, \\ x \leq 1; \end{cases}$

$x = 1, -5.$

3. Определим знаки:



## Тренировочные задачи

Решите следующие уравнения и неравенства:

1.  $\sqrt{2x^2 - 21x + 4} = 2 - 11x.$
2.  $\sqrt{3x^2 - 25x + 51} = 7 - 2x.$
3.  $\sqrt{x^4 - 2x - 5} = 1 - x.$
4.  $\sqrt{4 - x} - \sqrt{5 + x} = 3.$
5.  $\sqrt{14 - x} - \sqrt{x - 4} = \sqrt{x - 1}.$
6.  $\sqrt{x+1} - 1 = \sqrt{x} - \sqrt{x+8}.$
7.  $\sqrt{x} + \sqrt{x(x+2)} - \sqrt{(x+1)^3} = 0.$
8.  $\frac{x-4}{\sqrt{x+2}} = x - 8.$
9.  $\sqrt{x-1} + \sqrt{x+2} = \sqrt{x+34} - \sqrt{x+7}.$
10.  $\sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 1.$
11.  $\sqrt{1+x}\sqrt{x^2 - 24} = x - 1.$
12.  $\sqrt[3]{2-x} = 1 - \sqrt{x-1}.$
13.  $6\sqrt[3]{x-3} + \sqrt[3]{x-2} = 5\sqrt[6]{(x-2)(x-3)}.$
14.  $\sqrt{x+3 - 4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8 - 6\sqrt{x-1}} = 1.$
15.  $(5x+2)\sqrt{1-x} + (5x-7)\sqrt{x} = 0.$
16.  $\sqrt{1-x} \leq \sqrt[4]{x+5}.$
17.  $\sqrt{7x-13} - \sqrt{3x-19} > \sqrt{5x-27}.$
18.  $\sqrt{x^2 + 3x + 2} - \sqrt{x^2 - x + 1} < 1.$
19.  $\sqrt{(x+5)(3x+4)} > 4(x-1).$
20.  $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} < \frac{3}{2}.$
21.  $\sqrt{x+2}\sqrt{x-1} + \sqrt{x-2}\sqrt{x-1} \geq 2.$
22.  $\sqrt{2 - \sqrt{x+3}} < \sqrt{x+4}.$
23.  $x - 4 < \frac{x^2}{(1 + \sqrt{x+1})^2}.$
24.  $\frac{1}{\sqrt{x+2}\sqrt{x-1}} + \frac{1}{\sqrt{x-2}\sqrt{x-1}} > 2.$

$$25. x + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} > \frac{35}{12}.$$

$$26. \sqrt{25 - x^2} + \sqrt{x^2 + 7x} > 3.$$

$$27. \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{3}{4}} < \frac{1}{x} - \frac{1}{2}.$$

$$28. x^2 \geq x(2 + \sqrt{12 - 2x - x^2}).$$

$$29. \sqrt{x + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{x - \frac{1}{x^2}} > \frac{2}{x}.$$

$$30. \sqrt{x+5} - \sqrt{-x-3} < 1 + \sqrt{(x+5)(-x-3)}.$$

$$31. 11\sqrt{2x - \sqrt{48x - 144}} > 2x - 12.$$

## Подготовительные задачи

*Решите следующие уравнения и неравенства:*

1.  $\sqrt{2x-3} - \sqrt{x+3} = 0.$

16.  $\sqrt{\frac{x-2}{1-2x}} > -1.$

2.  $(x^2 - 1)\sqrt{2x-1} = 0.$

17.  $\sqrt{3x-10} > \sqrt{6-x}.$

3.  $\sqrt{8-3x^2} = 1.$

18.  $\sqrt{x^2 + 2x - 3} < 1.$

4.  $\sqrt{x^2 - 4} = \sqrt{x-2}.$

19.  $\frac{3}{\sqrt{2-x}} < \sqrt{2-x} + 2.$

5.  $x - \sqrt{x+1} = 1.$

20.  $(x-1)\sqrt{x^2 - x - 2} \geq 0.$

6.  $\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} - 6 = 0.$

21.  $\sqrt{x^2} < x + 1.$

7.  $\sqrt{2-x} + \frac{4}{\sqrt{2-x}+3} = 2.$

22.  $\sqrt{2x-1} < x - 2.$

8.  $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = \frac{3}{2}.$

23.  $\sqrt{2x^2 - 3x - 5} < x - 1.$

9.  $\sqrt{7-x} = x - 1.$

24.  $3 - x > 3\sqrt{1 - x^2}.$

10.  $\sqrt{12+x} + x = 0.$

25.  $x < \sqrt{x+2}.$

11.  $\sqrt{6 - 4x + x^2} = x + 4.$

26.  $x < \sqrt{2-x}.$

12.  $\frac{\sqrt{2x+1}+1}{x} = 1.$

27.  $x + 3 < \sqrt{x+33}.$

13.  $2x^2 + 3x - \sqrt{2x^2 + 3x + 9} + 3 = 0.$

28.  $\sqrt{(x+3)(x-8)} > x + 2.$

14.  $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+4} = 1.$

29.  $3\sqrt{x} - \sqrt{x+3} > 1.$

15.  $\sqrt{4x+13} = \sqrt{3x+12} - \sqrt{x+1}.$

30.  $\sqrt{x+3} - \sqrt{x-1} > \sqrt{2x-1}.$

## § 5. Уравнения и неравенства с модулем

Стандартное *правило раскрытия модуля* основывается на его определении:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Раскрывая сразу несколько модулей, приходится разбирать случаи, которые задаются знаками выражений, стоящих под модулем. Однако, если количество модулей велико, то велико и число разбираемых случаев.

Его можно заметно сократить за счёт применения *метода интервалов*: так, все корни выражений  $f_i(x)$ , от каждого из которых в уравнении или неравенстве взят модуль, разбивают числовую прямую на промежутки<sup>1</sup> — и на любом из них каждый модуль  $|f_i(x)|$  раскрываеться уже вполне однозначно.

**Пример 5.1.** Решите уравнение

$$|x - 1| + 2|x - 3| = 5 - x.$$

Решение. Рассмотрим случаи:

$$1) \begin{cases} x \geq 3, \\ (x - 1) + 2(x - 3) = 5 - x, \end{cases} \quad x = 3;$$

$$2) \begin{cases} 1 \leq x < 3, \\ (x - 1) + 2(3 - x) = 5 - x, \end{cases} \quad 1 \leq x < 3;$$

$$3) \begin{cases} x < 1, \\ (1 - x) + 2(3 - x) = 5 - x, \end{cases} \quad x \in \emptyset.$$

Ответ:  $1 \leq x \leq 3$ .

Другой подход, напоминающий скорее не раскрытие, а *отбрасывание* модулей, применим к *простейшим* уравнениям и неравенствам вида

$$|f| = |g| \quad \text{или} \quad |f| \vee g.$$

Он использует *геометрический смысл* модуля, состоящий в том, что модуль  $|x|$  численно равен расстоянию на числовой прямой от точки  $x$  до точки 0.

---

<sup>1</sup>Число которых сравнимо с числом модулей.

Исходя из этого смысла, можно установить справедливость, например, таких утверждений:

- *уравнение  $|f| = |g|$  равносильно совокупности*

$$f = \pm g;$$

- *уравнение  $|f| = g$  равносильно системе*

$$\begin{cases} f = \pm g, \\ g \geq 0; \end{cases}$$

- *неравенство  $|f| < g$  равносильно двойному неравенству*

$$-g < f < g;$$

- *неравенство  $|f| > g$  равносильно совокупности*

$$\begin{cases} f > g \\ f < -g. \end{cases}$$

**Пример 5.2.** Решите неравенство

$$2||x - 2| - 3| < x + 4.$$

**Решение.**

$$\begin{aligned} 2||x - 2| - 3| &< x + 4; \\ -x - 4 &< 2(|x - 2| - 3) < x + 4; \\ -x + 2 &< 2|x - 2| < x + 10; \\ \begin{cases} -x - 10 < 2(x - 2) < x + 10; \\ \begin{cases} 2(x - 2) > -x + 2, \\ 2(x - 2) < x - 2; \end{cases} \end{cases} \\ \begin{cases} -2 < x < 14; \\ \begin{cases} x < 2 \\ x > 2. \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

*Ответ:*  $-2 < x < 2, 2 < x < 14$ .

Задачу можно решить раскрытием модулей, рассмотрев два случая, в каждом из которых — еще по два случая.

$$1) \begin{cases} x \geq 2, \\ 2|x - 5| < x + 4; \end{cases}$$

$$1a) \begin{cases} x \geq 5, \\ 2x - 10 < x + 4; \end{cases} \quad 5 \leq x \leq 14;$$

$$1b) \begin{cases} 2 \leq x < 5, \\ -2x + 10 < x + 4; \end{cases} \quad 2 < x < 5;$$

$$2) \begin{cases} x < 2, \\ 2|x + 1| < x + 4; \end{cases}$$

$$2a) \begin{cases} -1 \leq x < 2, \\ 2x + 2 < x + 4; \end{cases} \quad -1 \leq x < 2;$$

$$2b) \begin{cases} x < -1, \\ -2x - 2 < x + 4; \end{cases} \quad -2 < x < -1.$$

Объединив все четыре промежутка, получим ответ.

Полезную роль при преобразовании выражений могут сыграть следующие *свойства модулей*:

$$|x|^2 = x^2;$$

$$|x| = \sqrt{x^2};$$

$|xy| = |x| \cdot |y|$  — модуль произведения;

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \quad (y \neq 0) \text{ — модуль дроби;}$$

$$|x| \geq x;$$

$|x + y| \leq |x| + |y|$  — неравенство треугольника<sup>1</sup>;

$$|x - y| \geq ||x| - |y||.$$

Наконец, первое из перечисленных здесь свойств порождает ещё один способ избавления от модулей — а именно, *возвведение их в квадрат*.

Согласно указанному свойству и основному правилу возведения в квадрат уравнения или неравенства, к примеру, имеем: *неравенство*

$$|f| \vee |g|$$

<sup>1</sup> Или модуль суммы: здесь неравенство обращается в равенство тогда и только тогда, когда слагаемые имеют одинаковый знак.

равносильно неравенству

$$f^2 \vee g^2$$

(при дальнейшей работе с полученным неравенством выполнять реальное возвведение в квадрат вовсе не обязательно: наоборот, лучше применить формулу разности квадратов).

Из сказанного вытекает, что к неравенствам вида

$$(|f| - |g|) \cdot h \vee 0$$

также применим **метод замены множителя: множитель**

$$|f| - |g|$$

**можно заменить множителем**

$$f^2 - g^2$$

*того же знака.*

**Пример 5.3.** Решите неравенство

$$x(|x^2 - 1| - 2|x - 1|) < 0.$$

**Решение.**


$$x(|x^2 - 1| - 2|x - 1|) < 0;$$

$$x((x^2 - 1)^2 - (2x - 2)^2) < 0 \text{ (так как } |f| - |g| \text{ и } f^2 - g^2 \text{ — одного знака);}$$

$$x((x^2 - 1) + (2x - 2))((x^2 - 1) - (2x - 2)) < 0;$$

$$x(x^2 + 2x - 3)(x^2 - 2x + 1) < 0;$$

$$x(x+3)(x-1)^3 < 0;$$



*Ответ:*  $x < -3, 0 < x < 1$ .

## Тренировочные задачи

Решите следующие уравнения и неравенства:

1.  $|2 - 5x^2| = 3.$
2.  $|x^2 - 13x + 35| = |35 - x^2|.$
3.  $|2x + 8| - |x - 5| = 12.$
4.  $|5x - 3| - |7x - 4| = 2x - 1.$
5.  $|x| - 2|x + 1| + 3|x + 2| = 0.$
6.  $2|x + 6| - |x| + |x - 6| = 18.$
7.  $|||x - 1| + 2| - 1| + 1| = 2.$
8.  $|2x - 15| = 22 - |2x + 7|.$
9.  $\sqrt{(x - 2)^2} + \sqrt{(x - 3)^2} = 1.$
10.  $|x^2 - 2x - 1| = \frac{5x + 1}{3}.$
11.  $|x - 1| > \frac{x + 1}{2}.$
12.  $|2x - 4| - |3x + 9| > |x - 1| - 6.$
13.  $||x + 1| - |x - 1|| < 1.$
14.  $|x^2 - 2x - 3| < 3x - 3.$
15.  $x^2 - |5x - 3| - x < 2.$
16.  $x^2 + 4 \geq |3x + 2| - 7x.$
17.  $(|x - 1| - 3)(|x + 2| - 5) < 0.$
18.  $|x^2 + x - 2| + |x + 4| \leq x^2 + 2x + 6.$
19.  $|x^2 - 2x - 8| > 2x.$
20.  $x^2 + x - 10 < 2|x - 2|.$
21.  $2x > \frac{5x + 3}{|x + 2|}.$
22.  $\frac{|x + 1| + |x - 2|}{x + 199} < 1.$
23.  $\frac{|x - 2|}{|x - 1| - 1} \geq 1.$
24.  $\frac{3}{|x + 1| - 1} \geq |x|.$
25.  $\left| \frac{x^2 - 3x - 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3.$
26.  $\frac{x^2 - 7|x| + 10}{x^2 - 6x + 9} < 0.$
27.  $\frac{|x - 3|}{x^2 - 5x + 6} \geq 2.$
28.  $\frac{x^2 - |x| - 12}{x - 3} \geq 2x.$
29.  $|x^3 - 1| \geq 1 - x.$
30.  $\left| \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 4} \right| \leq 1.$

## Подготовительные задачи

*Решите следующие уравнения и неравенства:*

1.  $|x - 1| = x - 1.$
2.  $|x + 2| = 2(3 - x).$
3.  $|3x - 2| + x = 11.$
4.  $|x| - |x - 2| = 2.$
5.  $|1 - x^2| = 8.$
6.  $|2x - 3| = 3 - 2x.$
7.  $x^2 + |x| - 2 = 0.$
8.  $(x - 7)^2 - |x - 7| = 30.$
9.  $x^2 - 6x + 8 + |x - 4| = 0.$
10.  $3|x + 2| + x^2 + 6x + 2 = 0.$
11.  $|5 - 2x| < 1.$
12.  $\left|3x - \frac{5}{2}\right| \geq 2.$
13.  $|x - 2| \leq |x + 4|.$
14.  $2|x + 1| \leq x + 4.$
15.  $|x + 2| - |x - 1| + \frac{3}{2} < x.$
16.  $|x + 1| - |x - 4| > 7.$
17.  $x^2 - 5|x| + 6 < 0.$
18.  $x^2 - |x| - 2 \leq 0.$
19.  $|x^2 - 5x| < 6.$
20.  $|x^2 - 2x| \leq x.$
21.  $|x - 4| > x^2 - 7x + 12.$
22.  $x^2 - 5x + 9 \leq |x - 6|.$
23.  $3x^2 - |x - 3| \geq 9x - 2.$
24.  $|x - 6| > |x^2 - 5x + 9|.$
25.  $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{|x|} \geq 2.$
26.  $\frac{3}{|x - 1|} \geq 2x + 5.$
27.  $\frac{|x + 3| - 1}{4 - 2|x + 4|} \geq -1.$
28.  $\frac{|2 - x| - x}{|x - 3| - 1} \leq 2.$
29.  $\frac{|1 - x| + 10}{4|x - 1| + 3} > 2.$
30.  $\frac{1}{|x + 1| - 1} \geq \frac{2}{|x + 1| - 2}.$

## § 6. Тригонометрические уравнения и неравенства

Решение практически любого тригонометрического уравнения или неравенства предполагает умение решать их *простейшие* варианты вида

$$\sin x \vee a,$$

$$\cos x \vee a,$$

$$\operatorname{tg} x \vee a,$$

$$\operatorname{ctg} x \vee a.$$

Простейшие *тригонометрические уравнения* решаются соответственно по формулам

$$\begin{aligned}\sin x = a &\Leftrightarrow x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \\ \cos x = a &\Leftrightarrow x = \pm \arccos a + 2\pi n, \\ \operatorname{tg} x = a &\Leftrightarrow x = \operatorname{arctg} a + \pi n, \\ \operatorname{ctg} x = a &\Leftrightarrow x = \operatorname{arcctg} a + \pi n,\end{aligned}$$

где  $n \in \mathbb{Z}$ , причём выражения  $\arcsin a$  и  $\arccos a$  определены тогда и только тогда, когда<sup>1</sup>  $|a| \leq 1$ .

Эти формулы полезно просто помнить наизусть. Однако они резко упрощаются в некоторых частных случаях, и запоминать их все представляется уже несколько обременительным.

Поэтому не менее полезно уметь иллюстрировать эти формулы на *единичной окружности*. Тем более что именно к ней восходит и непосредственный вывод формул корней, и само определение тригонометрических функций.

Что же касается простейших *тригонометрических неравенств*, то решать их явно<sup>2</sup>, как правило, не требуется. Обычно, если они и возникают в процессе решения, то носят лишь второстепенный характер и могут быть учтены каким-либо косвенным образом: например, алгебраически (при отборе значений тригонометрической функции) или на единичной окружности (при отборе значений аргумента).

<sup>1</sup> В противном случае и соответствующие уравнения не имеют решений.

<sup>2</sup> То есть доводить до ответа.

Знание следующих основных тригонометрических формул совершенно необходимо:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 — \text{основное тригонометрическое тождество};$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x};$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x — \text{синус двойного угла};$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x — \text{косинус двойного угла}.$$

**Пример 6.1.** Найдите все корни уравнения

$$\sin 2x - 3 = 3 \cos 2x$$

на промежутке  $\left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$ .

Решение.

$$\sin 2x - 3 = 3 \cos 2x;$$

$$2 \sin x \cos x - 3(\sin^2 x + \cos^2 x) = 3(\cos^2 x - \sin^2 x);$$

$$\cos x(\sin x - 3 \cos x) = 0.$$

Рассмотрим случаи:

$$1) \cos x = 0;$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

причём  $x \in \left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$  при  $n = -1$  ( $x = -\frac{\pi}{2}$ );

$$2) \begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \operatorname{tg} x = 3 \end{cases}$$

$$x = \arctg 3 + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

причём  $x \in \left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$  при  $k = 0$  ( $x = \arctg 3$ ).

Ответ:  $-\frac{\pi}{2}, \arctg 3$ .

Существует также масса полезных вспомогательных тригонометрических формул (каждая из которых справедлива только на общей

области определения её левой и правой частей):

$$\operatorname{tg}^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x};$$

$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$  — косинус двойного угла;

$$\operatorname{tg} 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x} \text{ — тангенс двойного угла;}$$

$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$  — синус суммы;

$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$  — синус разности;

$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$  — косинус суммы;

$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$  — косинус разности;

$$\operatorname{tg}(x+y) = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y} \text{ — тангенс суммы;}$$

$$\operatorname{tg}(x-y) = \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} y}{1 + \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y} \text{ — тангенс разности;}$$

$$2 \sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos x \text{ — синус половинного угла;}$$

$$2 \cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \cos x \text{ — косинус половинного угла;}$$

$$\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \text{ — тангенс половинного угла;}$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} \text{ — тангенс половинного угла;}$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \operatorname{tg} x = \frac{2t}{1-t^2}$$

(где  $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ ) — формулы универсальной подстановки;

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2};$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cdot \cos \frac{x+y}{2};$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2};$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \sin \frac{x-y}{2};$$

$$2 \sin x \cdot \cos y = \sin(x+y) + \sin(x-y);$$

$$2 \cos x \cdot \cos y = \cos(x+y) + \cos(x-y);$$

$$2 \sin x \cdot \sin y = \cos(x-y) - \cos(x+y).$$

Кроме того, целый ряд формул, называемых *формулами приведения*, получается применением единого механизма к функциям опре-

делённого вида. А именно, пусть заданы тригонометрическая функция  $f$  и целое число  $n$ , тогда выражение  $f\left(x + \frac{\pi}{2}n\right)$  приводится к виду  $\pm g(x)$ , причём:


- если  $n$  чётно, то функция  $g$  совпадает с функцией  $f$ , а если нечётно — то с кофункцией<sup>1</sup> для  $f$ ;
- перед  $g(x)$  ставится знак, одинаковый для всех  $x$  и совпадающий со знаком исходного выражения  $f\left(x + \frac{\pi}{2}n\right)$  при  $0 < x < \frac{\pi}{2}$ .

**Пример 6.2.** Решите уравнение

$$\sqrt{6 \sin x + 2 \cos x} = 0.$$

Решение.

$$\begin{aligned} \sqrt{6 \sin x + 2 \cos x} &= 0; \\ \left\{ \begin{array}{l} \cos x \leq 0, \\ 6 \sin x = 4 \cos^2 x; \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} \cos x \leq 0, \\ 3 \sin x = 2(1 - \sin^2 x); \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} \cos x \leq 0, \\ (\sin x + 2)(\sin x - \frac{1}{2}) = 0; \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} \cos x \leq 0, \\ \sin x = \frac{1}{2}. \end{array} \right. \end{aligned}$$



Ответ:  $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

---

<sup>1</sup> Кофункцией для синуса служит косинус, для косинуса — синус и т. д.

## Тренировочные задачи

Решите следующие уравнения и неравенства:

1.  $(\arccos x)^2 - 6 \arccos x + 8 = 0.$

2.  $\cos x(2 \cos^2 x - 1) = \frac{1}{4}.$

3.  $4 \sin 2x \cos 2x - 3 \sin^2 2x = 1.$

4.  $2 \sin^3 x - \sin^2 x \cos x + 2 \sin x \cos^2 x - \cos^3 x = 0.$

5.  $\sin x + \sin^2 x + \sin^3 x = \cos x + \cos^2 x + \cos^3 x.$

6.  $2 \sin x \cos x - 6(\sin x - \cos x) + 6 = 0.$

7.  $\sin 2x - \operatorname{tg} \frac{\pi}{10} \cos 2x = 1.$

8.  $(3 - \operatorname{ctg}^2 x) \sin 2x = 2(1 + \cos 2x).$

9.  $\operatorname{tg} 2x = 4 \cos^2 x - \operatorname{ctg} x.$

10.  $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} \cos x\right) = \operatorname{ctg}(\pi \sin x).$

11.  $2 \sin^2 x + \sin(x^2) = 1.$

12.  $\operatorname{tg} x = (2 + \sqrt{3}) \operatorname{tg} \frac{x}{3}.$

13.  $\operatorname{tg} 2x \operatorname{tg} 7x = 1.$

14.  $\begin{cases} \sqrt{1 + \sin 2x} - \sqrt{2} \cos 3x = 0, \\ \pi \leqslant x \leqslant \frac{3\pi}{2}. \end{cases}$

15.  $\begin{cases} \cos 2x + \sqrt{\frac{1 - \sin 2x}{2}} = 0, \\ \frac{3\pi}{2} \leqslant x \leqslant 2\pi. \end{cases}$

16.  $\sqrt{\cos 3x + \sqrt{3} \sin 3x - 3 \cos^2 x + \cos x + \frac{13}{4}} = \sqrt{3} \sin x + \frac{1}{2}.$

17.  $\sqrt{\operatorname{tg} x + \sin x} + \sqrt{\operatorname{tg} x - \sin x} = 2\sqrt{\operatorname{tg} x} \cos x.$

18.  $\operatorname{tg}(\pi \cdot \operatorname{tg} x) = \operatorname{ctg}(\pi \cdot \operatorname{ctg} x).$

19.  $2 \cos x + \sqrt{2} \sin 28x = 3\sqrt{2} + 2 \cos 28x \cdot \sin x.$

20.  $\operatorname{tg}(14x) + 3 \operatorname{ctg}(14x) + \sin 6x - 2\sqrt{2} \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{\sqrt{3} + 1}.$

21.  $\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{8}(3x - \sqrt{9x^2 + 160x + 800})\right) = 1, \\ x \in \mathbb{Z}. \end{cases}$

22.  $\sqrt{15x^2 + 2y^2 - 2z^2 - 3\sqrt{5}x - 2y + 10z - 4} + \sqrt{5x^2 - 2\sqrt{5}x \cos(\pi y) \cos(\pi z) + 1} = 0.$
23.  $20 \sin^2 x + 9 \cos x < 21.$
24.  $|\operatorname{tg} x| < \frac{1}{2}.$
25.  $\operatorname{tg} \frac{1}{1+x^2} \geq 1.$
26.  $2 \cos^2 x - (2 + \sqrt{2}) \cos x + \sqrt{2} > 0.$
27.  $|4 \cos^2 x - 1| + |4 \cos^2 x| = 2.$
28.  $\sqrt{5 - 2 \sin x} \geq 6 \sin x - 1.$
29.  $\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x} > 1.$
30.  $\sqrt{2 + \sin x - \sqrt{3} \cos x} > 1.$
31.  $6 \sin x \cdot \cos x > \sin x + \cos x + 1.$
32.  $\arcsin\left(x^2 + x + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \arccos\left(x^2 + x + \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$
33.  $\arcsin 2x = \arccos|x|.$
34.  $\sqrt{\arcsin x} + \sqrt{\arccos x} > \sqrt{\frac{7\pi}{12}}.$
35.  $\sin(\sin x) + \sin x \cdot \cos(\sin x) > 0.$
36.  $\left|2 \sin x + 2 \cos x + \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x + \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x}\right| \leq 2.$
37.  $2 \cos(\arcsin x) - \sin\left(\frac{1}{2} \arccos x\right) \leq 0.$
38. Сколько решений имеет уравнение  $\arccos(\cos 2x) = \frac{2x}{2009}$ ?
39.  $\arcsin(\sin x) + 3 \arccos(\cos x) \geq 3x - 18.$

### Подготовительные задачи

*Решите следующие уравнения и неравенства:*

1.  $\sin x = \frac{\pi}{3}$ .

2.  $\cos x = \sqrt{3}$ .

3.  $\sqrt{2} \cos^2 7x = \cos 7x$ .

4.  $(2 \sin x - \cos x)(1 + \cos x) = \sin^2 x$ .

5.  $2 \cos 2x + \cos x = 1$ .

6.  $\sqrt{3} \sin x - \operatorname{tg} x + \operatorname{tg} x \cdot \sin x = \sqrt{3}$ .

7.  $4 \sin^4 x + 12 \cos^2 x = 7$ .

8.  $3 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 2 \cos^2 x$ .

9.  $3 \operatorname{tg}^2 x + 7 = \frac{2}{\sin^2 x}$ .

10.  $\sin 3x + \sin x = \sin 2x$ .

11.  $1 - \sin 2x = \cos x - \sin x$ .

12.  $(\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x)^2 = 5 + \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$ .

13.  $3 \cos^2 x - \sin^2 x - 2 \sin x \cdot \cos x = 0$ .

14.  $\cos x + \sin x + 2 \sin x \cdot \cos x = 1$ .

15.  $\cos 3x + \sin(9x + 2) = 0$ .

16.  $\operatorname{tg} 3x = \operatorname{tg} x$ .

17.  $4 \cos x + 3 \sin x = 5$ .

18.  $2 \cos 3x = \sqrt{3} \cos x - \sin x$ .

19. 
$$\frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \cdot \operatorname{tg} x} = 2$$
.

20. 
$$\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} = (\sin x + \cos x)^2$$
.

21.  $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 5 \operatorname{tg} 2x + 7$ .

22.  $\sin^4 \frac{x}{3} + \cos^4 \frac{x}{3} = \frac{5}{8}$ .

23.  $\sin^2 x - \sin^2 2x + \sin^2 3x = \frac{1}{2}$ .

24. 
$$\frac{2 \sin^4 \frac{x}{2} - 1}{\cos^4 \frac{x}{2}} = 2$$
.

25.  $\sqrt{\sin x} + \cos x = 0$ .

$$26. \sin x > \frac{1}{2}.$$

$$27. \cos x \leq -\frac{1}{2}.$$

$$28. \operatorname{tg} x < 1.$$

$$29. \arcsin x = \arccos x.$$

$$30. \sin(\pi \cos x) = \cos(\pi \sin x).$$

## § 7. Комбинированные уравнения, неравенства и системы

Одно уравнение или неравенство вполне может содержать выражения нескольких, причём самых разных, типов: степенные, логарифмические, тригонометрические и т. д.

Простейший выход из такой ситуации иногда даёт замена *неизвестной*, после которой задача приобретает стандартный вид. При этом совершенно не обязательно явно обозначать новую неизвестную отдельной буквой.

**Пример 7.1.** Решите неравенство

$$10^{x^{\lg x}} \cdot 10^{\sqrt{10^{\lg^2 x}}} < 1\,000\,000.$$

Решение.

$$10^{x^{\lg x}} \cdot 10^{\sqrt{10^{\lg^2 x}}} < 1\,000\,000 \quad (= 10^6),$$

$$x^{\lg x} + \sqrt{10^{\lg^2 x}} < 6,$$

$$10^{\lg^2 x} + \sqrt{10^{\lg^2 x}} - 6 < 0,$$

$$(\sqrt{10^{\lg^2 x}} + 3)(\sqrt{10^{\lg^2 x}} - 2) < 0,$$

$$\sqrt{10^{\lg^2 x}} < 2,$$

$$10^{\lg^2 x} < 4,$$

$$\lg^2 x < \lg 4,$$

$$-\sqrt{\lg 4} < \lg x < \sqrt{\lg 4},$$

$$10^{-\sqrt{\lg 4}} < x < 10^{\sqrt{\lg 4}}.$$

Ответ:  $10^{-\sqrt{\lg 4}} < x < 10^{\sqrt{\lg 4}}$ .

Существенно более трудными следует признать такие уравнения или неравенства, которые не сводятся к стандартному виду никакой заменой. Как правило, их решение опирается на специфические свойства функций: монотонность, ограниченность, чётность (нечётность), периодичность и т. п.

Для функций, обладающих определёнными свойствами, можно сформулировать вполне конкретные утверждения, помогающие решать некоторые уравнения или неравенства, например: *строго монотонная на всей своей области определения функция не может принимать одинаковых значений в разных точках*.

**Пример 7.2.** Решите уравнение

$$3^{3-2x} - \log_2(2-3x) = 3^{2-3x} - \log_2(3-2x).$$

**Решение.**

$$3^{3-2x} - \log_2(2-3x) = 3^{2-3x} - \log_2(3-2x);$$

$$3^{3-2x} + \log_2(3-2x) = 3^{2-3x} + \log_2(2-3x);$$

$$f(3-2x) = f(2-3x), \quad \text{где } f(t) = 3^t + \log_2 t \text{ возрастает},$$

$$3-2x = 2-3x;$$

$$x = -1.$$

*Ответ:*  $x = -1$ .

Следующее утверждение связано с ограниченностью разных частей уравнения или неравенства: если все значения левой части — не меньше, а правой — не больше некоторой константы, то левая часть — не меньше правой, а их равенство друг другу возможно только тогда, когда обе они одновременно равны этой константе.

**Пример 7.3.** Решите неравенство

$$5^{2x^2-2x+1} \leq \sqrt{3 \sin(\pi x - \arctg \frac{4}{3}) + 4 \cos(\pi x - \arctg \frac{4}{3})}.$$

**Решение.**

$$5^{2x^2-2x+1} \leq \sqrt{3 \sin(\pi x - \varphi) + 4 \cos(\pi x - \varphi)},$$

где  $\varphi = \arctg \frac{4}{3}$ , причём  $\sin \varphi = \frac{4}{5}$  и  $\cos \varphi = \frac{3}{5}$ ,

$$\sqrt{5}^{4x^2-4x+2} \leq \sqrt{5} \sqrt{\cos \varphi \cdot \sin(\pi x - \varphi) + \sin \varphi \cdot \cos(\pi x - \varphi)};$$

$$\sqrt{5}^{(2x-1)^2+1} \leq \sqrt{5} \sqrt{\sin \pi x};$$

$$\sqrt{5}^{(2x-1)^2+1} = \sqrt{5} = \sqrt{5} \sqrt{\sin \pi x}, \quad \text{т. к. } \sqrt{5}^{(2x-1)^2+1} \geq \sqrt{5} \geq \sqrt{5} \sqrt{\sin \pi x};$$

$$\begin{cases} 2x-1=0, \\ \sin \pi x=1; \end{cases}$$

$$x = \frac{1}{2}.$$

*Ответ:*  $x = \frac{1}{2}$ .

**Пример 7.4.** Решите неравенство

$$\log_2(7^{-x^2} - 6)(7^{-x^2+9} - 1) + \log_2 \frac{7^{-x^2} - 6}{7^{-x^2+9} - 1} > \log_2(7^{3-x^2} - 5)^2.$$

**Решение.** Пусть  $t = 7^{-x^2}$ ,  $0 < t \leq 1$ , тогда неравенство принимает вид:

$$\log_5((t-6)(7^{16}t-1)) + \log_5 \frac{t-6}{7^{16}t-1} > \log_5(49t-5)^2.$$

$t < 0$ , поэтому  $7^{16}t-1 < 0$ . Значит

$$\begin{cases} \log_5(t-6)^2 > \log_5(49t-5)^2, \\ 0 < t < 7^{-16} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |t-6| > |49t-5|, \\ 0 < t < 7^{-16} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6-t > 5-49t, \\ 0 < t < 7^{-16} \end{cases} \Leftrightarrow 0 < t < 7^{-16}.$$

Тогда  $7^{-x^2} < 7^{-16} \Leftrightarrow x^2 > 16$ .

*Ответ:*  $x < -4$ ,  $x > 4$ .

**Пример 7.5.** Решите систему

$$\begin{cases} 2^x + 2^{2-x} \geq 3 \cdot 2^{0.5}, \\ \log_3 x + \log_{0.5} x < 1. \end{cases}$$

**Решение.** Решая первое неравенство как квадратное относительно  $2^x$ , получаем

$$\begin{cases} 2^x \leq 2^{1/2}, \\ 2^x \geq 2^{3/2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \frac{1}{2}, \\ x \geq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Переходя во втором неравенстве к основанию 3, получаем

$$1 > \log_3 x + \log_{0.5} x = \log_3 x \left(1 + \frac{1}{\log_3 0.5}\right) = \left(\log_{1/2} \frac{3}{2}\right) \log_3 x.$$

Так как  $-1 < \log_{1/2} \frac{3}{2} < -\frac{1}{2}$ , то  $-2 < \log_{3/2} \frac{1}{2} < -1$  и

$$x > 3^{\log_{3/2} \frac{1}{2}}.$$

*Ответ:*  $3^{\log_{3/2} \frac{1}{2}} < x \leq \frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{2} \leq x$ .

**Пример 7.6.** Решите систему

$$\begin{cases} 9^{\lg x} + x^{2 \lg 3} \geq 6, \\ \log_2 x + 6 > 5 \log_2 x. \end{cases}$$

**Решение.** Решения обоих неравенств ищем среди  $x > 0$ . Так как при  $x > 0$

$$9^{\lg x} = x^{2 \lg 3},$$

решая первое неравенство, получаем

$$9^{\lg x} \geq 3 \Leftrightarrow \lg x \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \geq \sqrt{10}.$$

Решая второе неравенство как квадратное относительно  $\log_2 x$ , получаем

$$\log_2^2 x + 6 > 5 \log_2 x \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x > 3, \\ \log_2 x < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 8, \\ 0 < x < 4. \end{cases}$$

Ответ:  $\sqrt{10} \leq x < 4, x > 8$ .

**Пример 7.7.** Решите систему неравенств

$$\begin{cases} 9^{x+1} - 28 \cdot 3^x + 3 \leq 0, \\ \log_{\sqrt{7}} 7^{\frac{2}{x^2+x}} \leq 2. \end{cases}$$

**Решение.** Решая первое неравенство как квадратное, относительно  $3^x$ , получаем  $-2 \leq x \leq 1$ . Второе неравенство эквивалентно следующему:

$$\frac{2}{x^2+x} \leq 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq (x+2)(x+1)x(x-1), \\ x \neq 0, x \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -2, \\ -1 < x < 0, \\ x \geq 1. \end{cases}$$

Ответ:  $\{-2\} \cup (-1; 0) \cup \{1\}$ .

**Пример 7.8.** Решите неравенство

$$((\sqrt{5}+2)^{x-1} - (\sqrt{5}-2)^{\frac{x-1}{x+1}})(\log_{5/2}(x-1)^2 - 2) \geq 0.$$

**Решение I.**

$$\log_{5/2}(x-1)^2 \leq 2 \Leftrightarrow 0 < (x-1)^2 \leq \left(\frac{5}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{7}{2}, \\ x \neq 1; \end{cases}$$

$$\log_{5/2}(x-1)^2 \geq 2 \Leftrightarrow (x-1)^2 \geq \left(\frac{5}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -\frac{3}{2}, \\ x \geq \frac{7}{2}. \end{cases}$$

II.

$$(\sqrt{5}+2)^{x-1} \geq (\sqrt{5}-2)^{\frac{x-1}{x+1}} = (\sqrt{5}+2)^{-\frac{x-1}{x+1}} \Leftrightarrow x-1 \geq -\frac{x-1}{x+1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x < -1, \\ x \geq 1; \end{cases}$$

$$(\sqrt{5}+2)^{x-1} \leq (\sqrt{5}-2)^{\frac{x-1}{x+1}} = (\sqrt{5}+2)^{-\frac{x-1}{x+1}} \Leftrightarrow x-1 \leq -\frac{x-1}{x+1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -2, \\ -1 < x \leq 1. \end{cases}$$

*Oтвет:*  $-2 \leq x \leq -\frac{3}{2}, -1 < x < 1, x \geq \frac{7}{2}$ .

## Тренировочные задачи

1. Сколько различных корней имеет уравнение

$$\sqrt{6x^2 + 2\sqrt{3}x + 3} = -2x?$$

2. Сколько различных корней имеет уравнение

$$\sqrt[4]{6(x^2 + 2)} + 2\sqrt{5}x = \sqrt[4]{35}(x^2 - 2) + 2\sqrt{7}x?$$

Решите следующие уравнения и неравенства:

3.  $\left(4|x-1| + \frac{1}{2}\right)^2 = 11(x-1)^2 + \frac{5}{4}.$

4.  $\frac{x^3 - 8 + 6x(2-x)}{|3-4x|} \leq \sqrt{4x-3}.$

5.  $\sqrt{\log_{\operatorname{tg} \frac{3\pi}{16}}(x-2)} \geq 1.$

6.  $\frac{1}{8}(\log_2(3x-2)^4)^2 = \frac{\lg(2-3x)}{\lg 2} 7^{2\log_7 \sqrt{3}}.$

7.  $\log_2 \frac{1}{|x-1|-1} = 1.$

8.  $3^{\log_3^2 x} + x^{\log_3 x} = 162.$

9.  $2 < \left|\log_{\frac{1}{2}}(3x+1) - 4\right| \leq 3.$

10.  $1 + \log_{\frac{1}{4}}(\log_3(4-x)) > 0.$

11.  $\log_{\sqrt[4]{9}}(\log_{\frac{1}{3}}(x+2)) \geq 2.$

12.  $\log_3 \left( \log_{\frac{1}{8}} \left( \left( \frac{3}{2} \right)^x - \frac{1}{2} \right) \right) \leq -1.$

13.  $2 \log_{\sqrt{2}} 3 + \log_{\sqrt{2}} \left( 3^{x^2-3} - \frac{1}{9} \right) < \log_{\sqrt{2}} 26.$

14.  $\log_2 \left( \log_3 \left( \frac{x-1}{x+1} \right) \right) < \log_{\frac{1}{8}} \left( \log_{\frac{1}{9}} \left( \frac{x^2+2x+1}{x^2-2x+1} \right) \right).$

15.  $3^{\frac{(\log_3 x)^2}{4}} \leq \frac{x^{\frac{(\log_3 x)}{3}}}{3}.$

16.  $\frac{x-1}{\log_3(9-3^x)-3} \leq 1.$

17.  $\log_{\frac{1}{3}}(2^{x+2} - 4^x) \geq -2.$

18.  $\log_x(\log_9(3^x - 9)) < 1.$

19.  $\frac{(x-0,5)(3-x)}{\log_2 |x-1|} > 0.$

20.  $\log_2(2^x - 1) \cdot \log_{\frac{1}{2}}(2^{x+1} - 2) > -2.$

21.  $\log_{\frac{4}{3}}(\sqrt{x+3} - \sqrt{x}) + \log_{\frac{5}{9}}\left(\frac{2}{3}\right) \geq 0.$

22.  $\log_{|x|}(\sqrt{9-x^2} - x - 1) \geq 1.$

23.  $\log_x 2x \leq \sqrt{\log_x(2x^3)}.$

24.  $\log_4(3^x - 1) \cdot \log_{\frac{1}{4}}\left(\frac{3^x - 1}{16}\right) \leq \frac{3}{4}.$

25.  $\sqrt{(\log_{\frac{1}{2}}x)^2 + 4 \log_2 \sqrt{x}} < \sqrt{2}(4 - \log_{16}x^4).$

26.  $\sqrt{x^{\log_2 \sqrt{x}}} \geq 2.$

27.  $\left(\frac{x}{10}\right)^{(\lg x)-2} < 100.$

28.  $49^{\log_x 5} - 7^{\log_x 5} - 2 \geq 0.$

29.  $\frac{21 - 2^x - 2^{6-x} - |3 - 2^x|}{5 - |2^x - 3|} \geq 1.$

30.  $(4x^2 - 16x + 7) \log_2(x - 3) > 0.$

31.  $\frac{\log_3(1 - 2x - x^2)}{\log_{3-\sqrt{5}}(x + 1 + \sqrt{2})} \geq 0.$

32.  $\log_{(2-5x)} 3 + \frac{1}{\log_2(2-5x)} \leq \frac{1}{\log_6(6x^2 - 6x + 1)}.$

33.  $\sqrt{17 \cdot 9^x - 4^x} \geq 3^x - 3 \cdot 2^x.$

34.  $\log_{\frac{1}{2}}(\sqrt{x+2} - x + 4) \geq -1 + \log_{\frac{1}{2}} 3.$

35.  $\log_{2x-3}(\sqrt{x+2} + x - 3) \leq 1.$

36.  $\frac{\sqrt{x^2 + x - 6} + 3x + 13}{x + 5} > 1.$

37.  $(2 + \sqrt{3})^x + 2 < (2 - \sqrt{3})^x.$

38.  $\log_{(\sqrt{8-2\sqrt{7}}+1-\sqrt{3})}(4x - x^2 - 2) \geq 0.$

39.  $\left(\frac{\lg x}{2}\right)^{\lg^2 x + \lg x^2 - 2} = \lg \sqrt{x}.$

40.  $9^{-|x|} = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x+1|+|x-1|}.$

41.  $x^2 \cdot 2^{x+1} + 2^{|x-3|+2} = x^2 \cdot 2^{|x-3|+4} + 2^{x-1}.$

42.  $x^2 2^{2x} + 9(x+2)2^x + 8x^2 \leq (x+2)2^{2x} + 9x^2 2^x + 8x + 16.$

43.  $x^{\left(\frac{1}{2} \log_2^3 x - \frac{15}{2} \log_x 2\right)} \leq \sqrt{2}.$

44.  $x^{\lg^2 x + \lg x^3 + 3} \leq \frac{2}{\frac{1}{\sqrt{x+1}-1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}}.$

45.  $\log_{x^2} \left( \frac{4x-5}{|x-2|} \right) \geq \frac{1}{2}.$

46.  $\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{(x^2-2x-15)^3}} \cdot 7^{(x+3)^2(x-5)} \leq 1.$

47.  $\frac{\log_5(x^2-4x-11)^2 - \log_{11}(x^2-4x-11)^3}{2-5x-3x^2} \geq 0.$

48.  $\log_2(\sqrt{x^2-4x}+3) > \log_{\frac{1}{2}} \left( \frac{2}{\sqrt{x^2-4x}+\sqrt{x+1}+1} \right) + 1.$

49.  $\sqrt{4-x} - 2 \leq x|x-3| + 4x.$

50.  $x(3x+2-2\sqrt{3-2x-x^2}) \geq 3|x|.$

51.  $5^{\log_x 2} \cdot \log_2 x + 5^{\log_2 x} \cdot \log_x 2 \leq 10.$

52.  $(x + \frac{8}{x}) \cdot \left| \log_{\frac{2x-3}{2}}(x^2 - 4x + 4) \right| \geq 9 \cdot \left| \log_{\frac{2x-3}{2}}(x^2 - 4x + 4) \right|.$

53.  $\left| \log_{x+1} \sqrt{(x-2)^4} + 2 \right| \geq -3 + \log_{\frac{1}{x+1}} \sqrt{(x-2)^6}.$

54.  $2^{\frac{5}{2}+2\cos 2x} - (2^{\frac{3}{2}}-1)4^{\cos^2 x} = -(2\sin^2 x)^{\frac{1}{2}\log_{\sqrt{2}\sin x}(\sqrt{2}-1)}.$

55.  $2\sin^2(\pi 2^{x+1}) - 4\sin(\pi 2^{x+1}) + \sin(\pi 2^{x+2}) + 4\sin^2(\pi 2^x) = 0.$

56.  $|\cos x|^{\sin^2 x - \frac{3}{2}\sin x + \frac{1}{2}} = 1.$

57.  $\log_{\frac{4-x^2-3x}{8}}(\cos x - \cos 3x) = \log_{\frac{4-x^2-3x}{8}}(\sin 2x).$

58.  $\log_{\operatorname{tg} x} \sqrt{\sin^2 x - \frac{5}{12}} < -1.$

59.  $\log_{(\sin x - \cos x)}(\sin x - 5\cos x) \geq 1.$

60.  $\sqrt{4\sin^2 x - 1} \cdot \log_{\sin x} \frac{x-5}{2x-1} \geq 0.$

61.  $\log_2 \left( \cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x} \right) = \frac{1}{y^2 - 2y + 2}.$

62.  $\log_3 |\pi x| + \log_{|\pi x|} 3 = \frac{2}{\sin^2(x+y) - 2\sin(x+y) + 2}.$

**Подготовительные задачи***Решите уравнения и неравенства*

1.  $\sqrt{x^2 + x + 4} \leq 2x + |3x - 2|.$

2.  $\sqrt{|x+1|-1} \geq \sqrt{|x+1|-2010}.$

3.  $\log_2 \left| 1 + \frac{9}{x^2} \right| < 1.$

4.  $|\log_3(x+2)| > 2.$

5.  $\log_{\frac{1}{3}}(26 - 3^x) + 2 < 0.$

6.  $5^{\log_3 \frac{2}{x+2}} < 1.$

7.  $\frac{\log_2(x+1)}{x-1} > 0.$

8.  $\frac{1 - \log_{0,5}(-x)}{\sqrt{2-6x}} < 0.$

9.  $\sqrt{\log_2 \left( \frac{3-2x}{1-x} \right)} < 1.$

10.  $\frac{3^x - 2}{x^2 - 6x + 5} \leq 0.$

11.  $9^{\log_3(1-2x)} = 5x^2 - 5.$

12.  $x^{2 \lg x} = 10x^2.$

13.  $\left( \frac{x}{10} \right)^{\lg x - 2} < 100.$

14.  $x^{\lg^2 x - 3 \lg x + 1} > 1000.$

15.  $3^{72} \cdot \left( \frac{1}{3} \right)^x \cdot \left( \frac{1}{3} \right)^{\sqrt{x}} > 1.$

16.  $2^{|x+2|} - |2^{x+1} - 1| = 2^{x+1} + 1.$

17.  $2^x + 2^{|x|} \geq 2\sqrt{2}.$

18.  $\log_3(3^x - 6) = x - 1.$

19.  $\log_3(4^x - 3) + \log_3(4^x - 1) = 1.$

20.  $\log_6 2^{x+3} - \log_6(3^x - 2) = x.$

21.  $\lg \sqrt{x+1} + 3 \lg \sqrt{1-x} = \lg \sqrt{1-x^2}.$

22.  $2(\lg 2 - 1) + \lg(5^{\sqrt{x}} + 1) = \lg(5^{1-\sqrt{x}} + 5).$

23.  $3\sqrt{\lg x} + 2\lg\sqrt{x^{-1}} = 2.$

24.  $\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_2(x^2-1)} > 1.$

25.  $\log_{\frac{4}{3}}(\sqrt{x+3} - \sqrt{x}) + \log_{\frac{4}{9}}\frac{2}{3} \geq 0.$

26.  $\log_5 \sqrt{3x+4} \cdot \log_x 5 > 1.$

27.  $(0,5)^{\log_3\left(\log_{\frac{1}{2}}\left(x^2 - \frac{4}{5}\right)\right)} < 1.$

28.  $\log_{\frac{1}{2}}x + \log_3 x > 1.$

29.  $\sqrt{x^{\log_2 \sqrt{x}}} \geq 2.$

30.  $\log_{(x^2+2x-3)} \frac{|x+4| - |x|}{x-1} > 0.$

31.  $81^{(\sin 2x-1) \cos 3x} - 9^{(\sin x - \cos x)^2} = 0.$

32.  $(\sqrt{5+2\sqrt{6}})^{\sin x} + (\sqrt{5-2\sqrt{6}})^{\sin x} = \frac{10}{3}.$

33.  $\log_{\frac{-6x-x^2}{10}}(\sin 3x + \sin x) = \log_{\frac{-6x-x^2}{10}} \sin 2x.$

34. Решите систему неравенств  $\begin{cases} 5 \cdot 25^{\lg x} + 5 < 26x^{\lg 5}, \\ \log_2^2 x + 6 \geq 5 \log_2 x. \end{cases}$

*Решите неравенство:*

35.  $(2^{2x+1} - 9 \cdot 2^x + 4) \log_3 \frac{x-1}{x} \geq 0.$

36.  $((5 + \sqrt{24})^{x-1} - (5 - \sqrt{24})^{\frac{x-1}{x+1}})(\log_{5/2}(x-1)^2 - 2) \geq 0.$

37.  $5^{1/(2-x)} (\log_x^2 3 - 9) \leq 0.$

38.  $\frac{(\log_x 4 - 2)^2}{2^x - 5 \cdot 2^{x+1} + 16} \geq 0.$

*Решите систему неравенств*

39.  $\begin{cases} 9^{x+1} - 28 \cdot 3^x + 3 \leq 0, \\ \log_{\sqrt{5}} 5^{\frac{2}{x^2+x}} \leq 2. \end{cases}$

40.  $\begin{cases} 25^x - 26 \cdot 5^x + 25 \geq 0, \\ (2x^2 - 9x + 10) \log_5(x+1) \geq 0. \end{cases}$

$$41. \begin{cases} 4^x - 6 \cdot 2^x + 8 \leq 0, \\ \log_3 \frac{2x^2 + 3x - 5}{x + 1} \leq 1. \end{cases}$$

$$42. \begin{cases} 3 \cdot 9^x - 28 \cdot 3^x + 9 \leq 0, \\ \log_{x^4}(x - 1)^4 \leq 1. \end{cases}$$

$$43. \begin{cases} 2^x + 32 \cdot 2^{-x} \geq 33, \\ 2 \log_9(4x^2 + 1) \geq \log_3(3x^2 + 4x + 1). \end{cases}$$

# Диагностическая работа 1

1. Решите неравенство

$$\frac{x^2 - 2x + 3}{x^2 - 4x + 3} > -3.$$

2. Решите неравенство

$$\frac{7}{(x-2)(x-3)} + \frac{9}{x-3} + 1 < 0.$$

3. Решите неравенство

$$\frac{4^x + 2x - 4}{x - 1} \leq 2.$$

4. Решите неравенство

$$\frac{x + 1 - \log_3 9x}{1 - \log_3 x} \geq 1.$$

5. Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{6+x-x^2}}{2x+5} \geq \frac{\sqrt{6+x-x^2}}{x+4}.$$

6. Решите неравенство

$$\frac{3}{|x+3|-1} \geq |x+2|.$$

7. Решите уравнение

$$(2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1) \sqrt{\operatorname{tg} x} = 0.$$

8. Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{2+2x-x^2} + x - 2}{\log_3 \left( \frac{5}{2} - x \right) + \log_3 2} \leq 0.$$

9. Решите систему

$$\begin{cases} 9^{\lg x} + x^{2 \lg 3} \geq \frac{2}{3}, \\ \log_2^2 x + 6 > \frac{5}{\log_x 2}. \end{cases}$$

## Диагностическая работа 2

1. Решите неравенство

$$\frac{x^2 - 3x + 24}{x^2 - 3x + 3} < 4.$$

2. Решите неравенство

$$\frac{(x+2)(x^2 - 2x + 1)}{4 + 3x - x^2} \geq 0.$$

3. Решите неравенство

$$\frac{2^x + x - 10}{2^x - 8} \leq 1.$$

4. Решите неравенство

$$\log_x \frac{2x - 1}{x - 1} > 1.$$

5. Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{x^2 - x - 6} + 3x + 10}{x + 4} > 1.$$

6. Решите неравенство

$$\frac{(x+1)(x+2)}{x^2 - |x| - 2} \geq -3x.$$

7. Решите уравнение

$$\sqrt[4]{12} \sin x = \sqrt{\sin 2x}.$$

8. Решите неравенство

$$\log_{\frac{1}{2}} \left( 5^{1+\lg x} - \left( \frac{1}{2} \right)^{1+\lg x} \right) \geq -1 + \lg x.$$

9. Решите систему

$$\begin{cases} 10\sqrt{\lg x} + x\sqrt{\log_2 10} < 200, \\ \log_2 x + 6 \geq 5 \log_2 x. \end{cases}$$

## Диагностическая работа 3

**1. Решите неравенство**

$$\frac{2x+3}{3x+2} \geq \frac{4x+1}{x+4}.$$

**2. Решите неравенство**

$$\frac{20}{(x-3)(x-4)} + \frac{10}{x-4} + 1 > 0.$$

**3. Решите неравенство**

$$x^2 3^x - 3^{x+1} \leq 0.$$

**4. Решите неравенство**

$$(x+1) \log_8(x^2 + 2x - 2) < 0.$$

**5. Решите неравенство**

$$\frac{\sqrt{2x^2 - 5x + 2}}{2x^2 + 6x} \leq 0.$$

**6. Решите неравенство**

$$\frac{x^2 - 1}{|x| - 1} > 0.$$

**7. Решите уравнение**

$$(1 + \cos x) \sqrt{\operatorname{tg} \frac{x}{2}} - 2 + \sin x = 2 \cos x.$$

**8. Решите неравенство**

$$\frac{6}{2x+1} > \frac{1 + \log_2(x+2)}{x}.$$

**9. Решите систему**

$$\begin{cases} 3^{\log_3^2 x} + x^{\log_3 x} > 2\sqrt[4]{3}, \\ \log_2^2 x + 6 \geq 5 \log_2 x. \end{cases}$$

## Диагностическая работа 4

1. Решите неравенство

$$\frac{3x^2 - 2x - 1}{2x^2 + 5x + 3} < \frac{2x^2 - 3x + 1}{3x^2 + 7x + 4}.$$

2. Решите неравенство

$$\frac{(x-2)(x-4)(x-7)}{(x+2)(x+4)(x+7)} > 1.$$

3. Решите неравенство

$$(\sqrt{5} - 2)^{\frac{x-1}{x+1}} \leq (\sqrt{5} + 2)^{x-1}.$$

4. Решите неравенство

$$\log_{x^2}(x^2 + x - 1) < 0.$$

5. Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{2-x} + 4x - 3}{x} \geq 2.$$

6. Решите неравенство

$$\frac{|2x+7| - 3x - 4}{x + 5 - |5x-7|} \leq 0.$$

7. Решите уравнение

$$\sqrt{\cos x} = \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}.$$

8. Решите неравенство

$$\frac{(|2x+1|-x-2)(\log_{\frac{1}{3}}(x+4)+1)}{2^{x^2}-2^{|x|}} \geq 0.$$

9. Решите неравенство

$$\left(2^{x^2} - 2^{2-x^2} + 2^{0,5}\right)^{-1} \log_{x^2}\left(\frac{x+2}{x^2}\right) \leq 0.$$

## Диагностическая работа 5

1. Решите неравенство

$$\frac{\frac{1}{x-1} - 1}{1 - \frac{1}{x-7}} \geq 0.$$

2. Решите неравенство

$$(x^2 + 3x)(2x + 3) - 16 \frac{2x+3}{x^2+3x} \geq 0.$$

3. Решите неравенство

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{(x^2-2x-15)^{\frac{3}{2}}} \cdot 7^{(x+3)^2(x-5)} \leq 1.$$

4. Решите неравенство

$$\log_{5-4x-x^2}(5 - 9x - 2x^2) \leq \log_{1-x}(1 - 2x).$$

5. Решите неравенство

$$\sqrt{4x - x^2 - 3} \geq \sqrt{x^2 - 7x + 12} - \sqrt{x^2 - 5x + 6}.$$

6. Решите неравенство

$$||x^2 - 8x + 2| - x^2| \geq 2x + 2.$$

7. Решите уравнение

$$\operatorname{tg} x \cdot \sqrt{\sin x - 2 \cos x - 1} = 0.$$

8. Решите уравнение

$$\log_{\frac{2}{\sqrt{2-\sqrt{3}}}}(x^2 - 4x - 2) = \log_{\frac{1}{2-\sqrt{3}}}(x^2 - 4x - 3).$$

9. Решите неравенство

$$3^{1/(x-2)} (\log_x^2 3 - 9) \leq 0.$$

## Диагностическая работа 6

1. Решите уравнение

$$\frac{(x^2+1)x}{(x^2-x+1)^2} = \frac{10}{9}.$$

2. Решите уравнение

$$x^2 + \frac{x^2}{(x+1)^2} = \frac{40}{9}.$$

3. Решите неравенство

$$\left(\frac{4x^2}{x^4+1}\right)^{3x^2-x} > \left(\frac{x^4+1}{4x^2}\right)^{x-2}.$$

4. Решите неравенство

$$\frac{\log_{1-4x^2}(|x|-4)^2}{\log_{1-4x^2}(10x^2+5x+\frac{1}{2})} \leq 2.$$

5. Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{1+3^{-x}}}{\sqrt{1+3^{-x}}-\sqrt{1-3^{-x}}} - \frac{3^{-x}-1}{\sqrt{1-9^{-x}}+3^{-x}-1} \geq \frac{1+\sqrt{1-9^{-x}}}{3^{-x}}.$$

6. Решите неравенство

$$\frac{(x^2+x+1)^2 - 2|x^3+x^2+x| - 3x^2}{10x^2-17x-6} \geq 0.$$

7. Найдите все решения неравенства

$$\sqrt{6 \cos x - \sin x + 4} < \sin x + \cos x$$

принадлежащие отрезку  $[0; 2\pi]$ .

8. Решите неравенство

$$x \geq \log_2(101 \cdot 10^x - 10^{2+2x}) - \log_5(101 \cdot 2^x - 5^{2+x} \cdot 2^{2+2x}).$$

9. Решить систему неравенств

$$\begin{cases} 3 \cdot 9^x - 28 \cdot 3^x + 9 \leq 0, \\ \log_{x^2}(x-1)^2 \leq 1. \end{cases}$$

## **Рекомендуемая литература**

Для прохождения школьного курса математики необходим комплект школьных учебников, желательно из федерального комплекта, утверждённого Министерством образования РФ. При этом для подготовки к ЕГЭ, кроме учебников по математике, предназначенных для 10—11 классов, нужны также учебники по планиметрии для 7—9 классов и по алгебре для 8—9 классов.

Кроме учебников, особенно для изучения приёмов решения уравнений и неравенств, рекомендуем использовать проверенные временем методические пособия, задачники по элементарной математике, сборники конкурсных задач по математике. Вот некоторые из них.

1. Сборник задач по математике для поступающих в вузы / Под ред. М. И. Сканави. М.: Высшая школа, 1998 и др. издания.
2. Моденов П. С. Сборник задач по специальному курсу элементарной математики. М.: Высшая школа, 1960.
3. Моденов В. П. Пособие по математике. Части I—II. М.: Издательство московского университета, 1977.
4. Дорофеев Г. В., Потапов М. К., Розов Н. Х. Математика для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1976 и др. издания.
5. Мельников И. И., Сергеев И. Н. Как решать задачи по математике на вступительных экзаменах. М. Учебно-научный центр довузовского образования МГУ, 1994.
6. Шабунин М. И. Математика для поступающих в вузы. М.: Лаборатория базовых знаний, 1999.
7. Сергеев И. Н. 1000 вопросов и ответов. Математика. М.: Университет книжный дом, 2000.
8. Сергеев И. Н. Математика задачи с ответами и решениями. М.: КДУ, 2003.
9. Сергеев И. Н. ЕГЭ. Математика. Задания типа С. М.: Экзамен, 2009.
10. Шарыгин И. Ф. Решение задач. М.: Просвещение, 1994.
11. Шарыгин И. Ф., Голубев В. И. Факультативный курс по математике. Решение задач. М.: Просвещение, 1991.

12. Голубев В. И. Решение сложных и нестандартных задач по математике. М.: ИЛЕКСА, 2007.
13. Вступительные экзамены и олимпиады по математике / Под ред. И. Н. Сергеева. М.: Механико-математический факультет МГУ, разные годы.
14. Задачи вступительных экзаменов по математике / Под ред. Е. А. Григорьева. М.: Факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ, разные годы.
15. Говоров В. М., Дыбов П. Т., Мирошин Н. В., Смирнова С. Ф. Сборник конкурсных задач по математике. М.: Наука, 1986.
16. Нестеренко Ю. В., Олехник С. Н., Потапов М. К. Задачи вступительных экзаменов по математике. М.: Факториал, 1995.
17. Ященко И. В., Шестаков С. А., Захаров П. И. Подготовка к ЕГЭ по математике. 2012. М.: МЦНМО, 2012.
18. Ященко И. В., Шестаков С. А., Захаров П. И. Математика. ЕГЭ. Тематическая рабочая тетрадь. М.: Экзамен, 2010.
19. Математика. Сборник тренировочных работ / Под ред. А. Л. Семенова и И. В. Ященко. М.: МЦНМО, 2009.
20. Математика. ЕГЭ-2010. Типовые тестовые задания / Под ред. А. Л. Семенова и И. В. Ященко. М.: Экзамен, 2009.
21. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ-2010. Математика / Под ред. А. Л. Семенова и И. В. Ященко. М.: Астрель, 2009.
22. Панфёров В. С., Сергеев И. Н. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение сложных задач. ФИПИ; М.: Интеллект-Центр, 2010.

Мы не считаем, что все перечисленные книги должны находиться в личной библиотеке абитуриента, да это и невозможно. Однако каждая из них по-своему полезна и найдёт своего благодарного читателя.

## Ответы

Ниже допускаются ответы в разной форме: как в виде множеств, так и в виде равенств или неравенств (возможно, двойных). Как отмечалось ранее, главной характеристикой ответа была и остаётся его математическая правильность.

### Диагностическая работа

1.  $-1 \leq x \leq 2.5$ .   2.  $x < -3, 0 \leq x < 1, x = 3$ .   3.  $x < -2, x > -2$ .   4.  $x < -5, -2 \leq x < 2, x > 2$ .   5.  $x \leq -2, x \geq 4$ .   6.  $-2 < x < -1, 3 < x < 5$ .   7.  $x = 2$ .  
8.  $-7 \leq x < -6, -5 \leq x \leq -1, x = 1$ .   9.  $1 \leq x \leq 3$ .   10.  $-2 < x < 2, 2 < x < 14$ .   11.  $x < -3, 0 < x < 1$ .   12.  $x = -\frac{\pi}{2}, \arctg 3$ .   13.  $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ .   14.  $10^{-\sqrt{\lg 4}} < x < 10^{\sqrt{\lg 4}}$ .   15.  $x = -1$ .   16.  $x = \frac{1}{2}$ .   17.  $3^{\log_{3/2} \frac{1}{2}} < x \leq \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \leq x$ .

### § 1. Рациональные уравнения и неравенства

#### Тренировочные задачи

1.  $x = 1, x = 2009$ .   2.  $x = 1, x = -2011$ .   3.  $x = -1, x = -2010$ .   4.  $1 < x < 2009$ .  
5.  $-2011 \leq x \leq 1$ .   6.  $x \leq -2010, x \geq -1$ .   7.  $x = -3, x = 1$ .   8.  $-3 < x < 1$ .  
9.  $x = -1$ .   10.  $x = -1$ .   11.  $x = -4, x = 2$ .   12.  $x = -1, x = 12$ .   13.  $-1 < x < 12$ .  
14.  $x = -2, x = 6, x = 3 - \sqrt{21}, x = 3 + \sqrt{21}$ .   15.  $(-\infty; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; 4)$ .  
16.  $(-\infty; -2] \cup (-1; 4)$ .   17.  $(-\infty; -5] \cup (1; 2) \cup (6; +\infty)$ .   18.  $-1 < x < 5$ .  
19.  $(-5; 1) \cup \{3\}$ .   20.  $[1; 2) \cup (2; 4]$ .   21.  $(-\infty; -1] \cup (4; +\infty)$ .   22.  $(-1; 0) \cup \cup (0; 1)$ .   23.  $(-5; 1)$ .   24.  $(-\infty; -\sqrt{7}) \cup (-2; \sqrt{7}) \cup \left(\frac{8}{3}; +\infty\right)$ .   25.  $[1; 2) \cup \cup (3; 4)$ .   26.  $\left(-\frac{11+\sqrt{737}}{28}; \frac{4}{7}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{737}-11}{28}; 1\right)$ .   27.  $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ .  
28.  $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}; 0\right) \cup \left(1; \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \cup (2; +\infty)$ .   29.  $(-5; 1) \cup (2; 3)$ .   30.  $(-\infty; -3) \cup \cup (-2; -1)$ .   31.  $(-\infty; -4] \cup [-2; -1] \cup [1; +\infty)$ .   32.  $(-\infty; -1] \cup (0; 1) \cup (2; 3)$ .  
33.  $-6 < x \leq 0, 2 < x < 3, x \geq 6$ .   34.  $-5 \leq x \leq 1, 2 < x < 3$ .   35.  $x < -9, \frac{2}{3} < x < 1, x \geq \frac{11}{2}$ .   36.  $1 < x \leq 2, 7 < x < 8$ .   37.  $x \leq -1, 2 \leq x < \frac{11}{4}, \frac{11}{4} < x \leq 3, x \geq 4$ .

#### Подготовительные задачи

1.  $x = 1, x = -\frac{4}{3}$ .   2.  $1 \leq x \leq \frac{4}{3}$ .   3. решений нет.   4. любое число.   5.  $x = -\frac{2}{3}, x = 3$ .  
6.  $x < -\frac{2}{3}, x > 3$ .   7.  $x = -\frac{2\sqrt{3}}{3}, x = -1, x = 1, x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ .   8.  $-\frac{2\sqrt{3}}{3} < x < -1, 1 < x < \frac{2\sqrt{3}}{3}$ .   9.  $x = -\sqrt{3}, x = \sqrt{3}$ .   10.  $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ .   11.  $x = -\sqrt[3]{\frac{2}{3}}, x = \sqrt[3]{3}$ .  
12.  $x < -\sqrt[3]{\frac{2}{3}}, x > \sqrt[3]{3}$ .   13.  $(1; 2) \cup (2; 3)$ .   14.  $(-\infty; -2) \cup (-2; -1) \cup (1; +\infty)$ .

15.  $(-\infty; -2) \cup \left(-2; -\frac{1}{2}\right) \cup \left(1; +\infty\right)$ . 16.  $-\frac{1}{3} < x < \frac{4}{5}$ . 17.  $x < \frac{3}{2}$ ,  $x > \frac{5}{3}$ .  
 18. любое действительное число. 19.  $x \leq 2$ ,  $x \geq 4$ . 20.  $(-\infty; 2) \cup (5; +\infty)$ .  
 21.  $(-\infty; 1) \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right)$ . 22.  $-7 < x < -3$ . 23.  $(-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$ . 24.  $(-\infty; 0) \cup$   
 $\cup (3; +\infty)$ . 25.  $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$ . 26.  $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right] \cup [8; +\infty)$ . 27.  $(-\infty; -20) \cup$   
 $\cup (23; +\infty)$ . 28.  $(-1; 0) \cup (4; +\infty)$ . 29.  $[1; 3] \cup (5; +\infty)$ . 30.  $-1 < x$ .  
 31.  $\left(-\frac{9}{2}; -2\right) \cup (3; +\infty)$ . 32.  $(-\infty; -2) \cup (-1; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ . 33.  $3 < x < 4$ .  
 34.  $[-3; 0) \cup [20; +\infty)$ . 35.  $(-\infty; -1] \cup (5; 6]$ . 36.  $3 < x$ . 37.  $x < -\sqrt{2}$ ,  $x > \sqrt{2}$ .  
 38.  $-2 < x < 2$ . 39.  $x < 0$ ,  $0 < x < 1$ . 40.  $-4 \leq x < -1$ ,  $-1 < x \leq 2$ .

## § 2. Показательные уравнения и неравенства

### Тренировочные задачи

1.  $x = 2$ . 2.  $x = -1$ . 3.  $x = 1$ . 4.  $x = 1$ ,  $x = 2$ . 5.  $x = \log_{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} \frac{3}{2}$ . 6.  $x = 3$ .  
 7.  $x = 0$ . 8.  $x = 0$ ,  $x = 2$ . 9.  $x = 10$ . 10.  $x = \pm 1$ . 11.  $x = -2$ ,  $x = 2$ . 12.  $x = \frac{1}{4}$ .  
 13.  $x = 4$ . 14.  $x = 1$ ,  $x = 3$ . 15.  $x = 2$ . 16.  $x = -\log_5 2$ ,  $x = 3$ . 17.  $x < \frac{1}{2}$ ,  $x > 1$ .  
 18.  $x \neq 2$ . 19.  $x > -2$ . 20.  $x < 0$ ,  $x > \log_4 3$ . 21.  $x \in \mathbb{R}$ . 22.  $x < 0$ ,  $x \geq 1$ .  
 23.  $x > 0$ . 24.  $x < \log_{0,4} 2$ . 25.  $-\frac{1}{2} < x < 0$ . 26.  $0 < x < \log_{\frac{2}{3}} \frac{1}{3}$ . 27.  $x \leq \log_3 \frac{1}{2}$ ,  
 $\log_3 \frac{3}{5} \leq x < \log_3 \frac{5}{3}$ . 28.  $x > \frac{1}{6}$ . 29.  $-1 < x < \frac{2}{3}$ . 30.  $x < 3 - \sqrt{3}$ ,  $x > 3 + \sqrt{3}$ .  
 31.  $x > \frac{\lg 21}{\lg 5 - \lg \sqrt{7}}$ . 32.  $\frac{1}{2} \log_5 6 < x < \log_6 5$ .

### Подготовительные задачи

1.  $x = 2$ ,  $x = 4$ . 2.  $x = 1$ . 3.  $x = \frac{38}{3}$ . 4.  $x = 1$ . 5.  $x = \log_{\frac{1}{3}} \frac{13}{8}$ . 6.  $x = 2$ .  
 7.  $x = 0$ . 8.  $x = \pm 2$ . 9.  $x = 2$ . 10.  $x = -2$ . 11.  $x = 2 - \sqrt{\frac{7}{2}}$ ,  $x = 2 + \sqrt{\frac{7}{2}}$ .  
 12.  $x = 0$ . 13.  $x = 0$ . 14.  $x = -2$ . 15.  $x = \log_{\frac{2}{7}} 3$ . 16.  $x < \frac{1}{2}$ . 17.  $x > -\frac{3}{4}$ .  
 18.  $x < 7$ . 19.  $x < -\frac{1}{2}$ ,  $x > \frac{5}{8}$ . 20.  $\frac{5}{3} < x < 2$ . 21.  $1 < x < 4$ . 22.  $x \leq 2$ .  
 23.  $0 < x < 1$ . 24.  $x > 0$ . 25.  $x < -\log_5 10$ . 26.  $x < 0$ ,  $1 < x < 3$ . 27.  $0 < x < \frac{1}{3}$ ,  
 $x > 4$ .

## § 3. Логарифмические уравнения и неравенства

### Тренировочные задачи

1.  $x = 1 + \sqrt[3]{2}$ . 2.  $x = 3$ . 3.  $x = 2^{-1}$ ,  $x = 2^{-\frac{1}{8}}$ . 4.  $x = 2^{-2}$ ,  $x = 2^{-\frac{1}{4}}$ . 5.  $x = 2^{-3}$ ,  
 $x = 2$ . 6.  $x = 1$ . 7.  $x = 100$ . 8.  $x = 5$ . 9.  $x = \frac{1}{81}$ ,  $x = \frac{1}{3}$ . 10.  $x = -\frac{3-\sqrt{3}}{3}$ ,

- 1.**  $x=8$ . **11.**  $x=\frac{1}{9}$ ,  $x=3$ . **12.**  $x=2$ . **13.**  $x=2$ ,  $x=1-\sqrt{33}$ . **14.**  $x=4$ . **15.**  $x=8$ .  
**16.**  $x=\frac{11+\sqrt{261}}{5}$ . **17.**  $1 < x < 2$ ,  $3 < x < 4$ . **18.**  $-1 \leq x < 1$ ,  $3 < x \leq 5$ . **19.**  $\frac{1}{3} \leq x < \frac{2}{3}$ . **20.**  $0 < x < 10$ . **21.**  $2 < x < 3$ ,  $x > 3$ . **22.**  $x > 3$ . **23.**  $0 < x \leq \frac{5}{8}$ ,  
 $2 \leq x < 4$ . **24.**  $\frac{1}{2} < x < 1$ . **25.**  $-3 < x < 1$ ,  $3 < x < 4$ . **26.**  $-2 < x < -1$ ,  $-1 < x < 0$ ,  
 $0 < x < 1$ ,  $x > 2$ . **27.**  $0 < x < 2$ ,  $x > 4$ . **28.**  $-1 < x < 0$ . **29.**  $0 < x < \frac{1}{\sqrt{5}}$ ,  $1 < x < 3$ .  
**30.**  $3 < x < 4$ ,  $x > 6$ . **31.**  $2^{-\sqrt{2}} < x < \frac{1}{2}$ ,  $1 < x < 2^{\sqrt{2}}$ .

### Подготовительные задачи

- 1.**  $x=0$ . **2.**  $x=\frac{3}{2}$ ,  $x=10$ . **3.**  $x=1$ . **4.**  $x=-2-\sqrt{10}$ . **5.**  $x=\frac{1}{10}$ ,  $x=10$ .  
**6.**  $x=10$ ,  $x=10000$ . **7.**  $x=\frac{1}{4}$ ,  $x=2$ . **8.**  $x=3$ . **9.**  $x=-4$ . **10.**  $x=3$ . **11.**  $x=4$ .  
**12.**  $x=\frac{1}{2}$ ,  $x=16$ . **13.**  $x=-\frac{9}{5}$ ,  $x=23$ . **14.**  $x=2$ . **15.**  $x=\frac{1}{2}$ ,  $x=128$ . **16.**  $\frac{1}{5} < x < \frac{2}{5}$ . **17.**  $\frac{1}{3} < x < 2$ . **18.**  $2 < x < 3$ . **19.**  $\frac{1}{3} \leq x < \frac{1}{2}$ . **20.**  $\frac{1}{2} \leq x \leq 4$ . **21.**  $0 < x \leq \frac{1}{2}$ ,  $2 < x \leq 4$ . **22.**  $\frac{1}{10} < x < 1$ ,  $1 < x \leq 10$ . **23.** Решений нет. **24.**  $1 < x \leq 2$ ,  
 $3 \leq x < 4$ . **25.**  $-\sqrt{5} < x < -2$ ,  $1 < x < \sqrt{5}$ . **26.**  $2 < x < 3$ . **27.**  $-3 < x < -\sqrt{6}$ ,  
 $\sqrt{6} < x < 3$ . **28.**  $4 < x$ . **29.**  $0 < x < 1$ ,  $\sqrt{3} < x < 9$ . **30.**  $1 < x < 4$ .

### § 4. Иррациональные уравнения и неравенства

#### Тренировочные задачи

- 1.**  $x=0$ . **2.**  $x=\frac{3-\sqrt{17}}{2}$ . **3.**  $x=-\sqrt{3}$ . **4.**  $x=-5$ . **5.**  $x=5$ . **6.**  $x=8$ . **7.**  $x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ . **8.**  $x=9$ . **9.**  $x=2$ . **10.**  $x=-\frac{8}{3}$ ,  $x=1$ . **11.**  $x=7$ . **12.**  $x=1$ ,  $x=2$ ,  
 $x=10$ . **13.**  $x=3\frac{1}{63}$ ,  $x=3\frac{1}{728}$ . **14.**  $5 \leq x \leq 10$ . **15.**  $x=\frac{1}{2}$ ,  $x=\frac{1}{5}$ ,  $x=\frac{4}{5}$ .  
**16.**  $-1 \leq x \leq 1$ . **17.**  $\frac{19}{3} \leq x < 9$ . **18.**  $x \leq -2$ ,  $-1 \leq x < \frac{\sqrt{13}-1}{6}$ . **19.**  $x \leq -5$ ,  
 $-\frac{4}{3} \leq x < 4$ . **20.**  $x < -1$ ,  $x > \frac{5}{3}$ . **21.**  $1 \leq x$ . **22.**  $\frac{-3-\sqrt{5}}{2} < x \leq 1$ . **23.**  $-1 \leq x < 8$ .  
**24.**  $1 < x < 2$ ,  $2 < x < \frac{5+\sqrt{5}}{2}$ . **25.**  $1 < x < \frac{5}{4}$ ,  $\frac{5}{3} < x$ . **26.**  $0 \leq x \leq 5$ . **27.**  $1 < x \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$ . **28.**  $-1 - \sqrt{13} \leq x \leq 0$ ,  $\frac{1+\sqrt{17}}{2} \leq x \leq \sqrt{13}-1$ . **29.**  $x > \sqrt[3]{\frac{5}{4}}$ . **30.**  $-5 \leq x < 2\sqrt{\sqrt{5}-2}-4$ . **31.**  $3 \leq x < 6$ ,  $6 < x < \frac{133}{2}-11\sqrt{6}$ .

#### Подготовительные задачи

- 1.**  $x=6$ . **2.**  $x=\frac{1}{2}$ ,  $x=1$ . **3.**  $x=-\sqrt{\frac{7}{3}}$ ,  $x=\sqrt{\frac{7}{3}}$ . **4.**  $x=2$ . **5.**  $x=3$ . **6.**  $x=-8$ ,  
 $x=27$ . **7.**  $x=1$ . **8.**  $x=\frac{5}{3}$ . **9.**  $x=3$ . **10.**  $x=-3$ . **11.**  $x=-\frac{5}{6}$ . **12.**  $x=4$ .

13.  $x = 0, x = -\frac{3}{2}$ . 14.  $x = 5$ . 15.  $x = -1$ . 16.  $\frac{1}{2} < x \leq 2$ . 17.  $4 < x \leq 6$ .  
 18.  $-1 - \sqrt{5} < x \leq -3, 1 \leq x < \sqrt{5} - 1$ . 19.  $x < 1$ . 20.  $x = -1, x \geq 2$ . 21.  $-\frac{1}{2} < x$ .  
 22.  $5 < x$ . 23.  $\frac{5}{2} \leq x < 3$ . 24.  $-1 \leq x < 0, \frac{3}{5} < x \leq 1$ . 25.  $-2 \leq x < 2$ . 26.  $x < 1$ .  
 27.  $-33 \leq x < 3$ . 28.  $x \leq -3$ . 29.  $1 < x$ . 30.  $1 \leq x < \frac{3}{2}$ .

### § 5. Уравнения и неравенства с модулем

#### Тренировочные задачи

1.  $x = -1, x = 1$ . 2.  $x = 0, x = \frac{70}{13}, x = \frac{13}{2}$ . 3.  $x = -25, x = 3$ . 4.  $x \leq \frac{4}{7}$ .  
 5.  $x = -2$ . 6.  $x = -12, 0 \leq x \leq 6$ . 7.  $x = 1$ . 8.  $-\frac{7}{2} \leq x \leq \frac{15}{2}$ . 9.  $2 \leq x \leq 3$ .  
 10.  $x = 1, x = 4$ . 11.  $x < \frac{1}{3}, x > 3$ . 12.  $-9 < x < 0$ . 13.  $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ . 14.  $2 < x < 5$ .  
 15.  $-5 < x < 3 + 2\sqrt{2}$ . 16.  $x \leq -5 - \sqrt{19}, x \geq \sqrt{2} - 2$ . 17.  $-7 < x < -2, 3 < x < 4$ .  
 18.  $-6 \leq x \leq -1, x \geq 0$ . 19.  $x < 2\sqrt{2}, x > 2 + 2\sqrt{3}$ . 20.  $-\frac{3 + \sqrt{65}}{2} < x < 3$ .  
 21.  $-\frac{9 + \sqrt{57}}{4} < x < -2, -2 < x < -1, x > \frac{3}{2}$ . 22.  $x < -199, -66 < x < 200$ .  
 23.  $x < 0, 2 < x$ . 24.  $-3 \leq x < -2, 0 < x \leq \sqrt{3}$ . 25.  $x < -2, x > -1$ . 26.  $-5 < x < -2, 2 < x < 3, 3 < x < 5$ . 27.  $\frac{3}{2} \leq x < 2$ . 28.  $x < 3$ . 29.  $x \leq -1, x \geq 0$ .  
 30.  $0 \leq x \leq \frac{8}{5}, x \geq \frac{5}{2}$ .

#### Подготовительные задачи

1.  $x \geq 1$ . 2.  $x = \frac{4}{3}$ . 3.  $x = -\frac{9}{2}, x = \frac{13}{4}$ . 4.  $x \geq 2$ . 5.  $x = -3, x = 3$ . 6.  $x \leq \frac{3}{2}$ .  
 7.  $x = -1, x = 1$ . 8.  $x = 1, x = 13$ . 9.  $x = 3, x = 4$ . 10.  $x = -4, x = -1$ .  
 11.  $2 < x < 3$ . 12.  $x \leq \frac{1}{6}, x \geq \frac{3}{2}$ . 13.  $x \geq -1$ . 14.  $x \leq -2, x \geq 2$ . 15.  $x > \frac{9}{2}$ .  
 16. Решений нет. 17.  $-3 < x < -2, 2 < x < 3$ . 18.  $-2 \leq x \leq 2$ . 19.  $-1 < x < 2, 3 < x < 6$ .  
 20.  $1 \leq x \leq 3$ . 21.  $2 < x < 4$ . 22.  $1 \leq x \leq 3$ . 23.  $x \leq \frac{4 - \sqrt{19}}{3}, x \geq \frac{4 + \sqrt{19}}{3}$ .  
 24.  $1 < x < 3$ . 25.  $-1 < x < 0, 0 < x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ . 26.  $x \leq -2, \frac{1}{2} \leq x < 1, 1 < x \leq \frac{\sqrt{73} - 3}{4}$ .  
 27.  $x \leq -8, -6 < x < -2, x > -2$ . 28.  $x < 2, x = 3, x > 4$ . 29.  $\frac{3}{7} < x < \frac{11}{7}$ .  
 30.  $-3 < x < -2, x = -1, 0 < x < 1$ .

### § 6. Тригонометрические уравнения и неравенства

#### Тренировочные задачи

1.  $x = \cos 2$ . 2.  $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, x = \pm \frac{\pi}{5} + 2n\pi; x = \pm \frac{3\pi}{5} + 2m\pi, k, n, m \in \mathbb{Z}$ .  
 3.  $x = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ . 4.  $x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ . 5.  $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ .

6.  $x = (2k+1)\pi$ ,  $x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ ,  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 7.  $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ ,  $x = \frac{7\pi}{20} + n\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ .  
 8.  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ,  $x = \frac{\pi}{4} + n\pi$ ,  $x = -\operatorname{arctg} \frac{1}{3} + m\pi$ ;  $k, n, m \in \mathbb{Z}$ . 9.  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ,  
 $x = \frac{\pi}{8} + \frac{n\pi}{2}$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 10.  $x = 2\arccos \frac{1}{\sqrt{5}} + k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . 11.  $x = \pm 1 + \sqrt{1 + \frac{\pi}{2} + 2k\pi}$ ,  
 $x = \pm 1 - \sqrt{1 + \frac{\pi}{2} + 2k\pi}$ ;  $k = 0, 1, 2, \dots$  12.  $x = 3k\pi$ ,  $x = -\frac{\pi}{4} + 3n\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ .  
 13.  $x = \frac{2n+1}{18}\pi$ ;  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n \neq 9k+4$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . 14.  $x = \frac{21\pi}{16}$ ,  $x = \frac{11\pi}{8}$ . 15.  $x = \frac{19\pi}{12}$ .  
 16.  $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ,  $x = \frac{3\pi}{4} + 2n\pi$ ,  $x = \frac{5\pi}{6} + 2m\pi$ ,  $k, n, m \in \mathbb{Z}$ . 17.  $x = k\pi$ ,  $x = \frac{\pi}{6} +$   
 $+ 2n\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 18.  $x = \operatorname{arctg} \frac{2k+1 \pm \sqrt{4k^2+4k-15}}{4} + n\pi$ ,  $x = \pm \operatorname{arctg} 2 + m\pi$ ;  
 $k = 3, \pm 4, \pm 5, \dots, n, m \in \mathbb{Z}$ . 19.  $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 20.  $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ,  $x = \frac{\pi}{6} + 2n\pi$ ;  
 $k, n \in \mathbb{Z}$ . 21.  $x = -31$ ,  $x = -7$ . 22.  $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ,  $y = 2$ ,  $z = 0$ ;  $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ,  $y = -1$ ,  $z = 5$ .  
 23.  $2k\pi \leq x < \arccos \frac{1}{4} + 2k\pi$ ,  $\arccos \frac{1}{5} + 2n\pi < x < -\arccos \frac{1}{5} + 2(n+1)\pi$ ,  
 $-\arccos \frac{1}{4} + 2(m+1)\pi < x \leq 2(m+1)\pi$ ;  $k, n, m \in \mathbb{Z}$ . 24.  $\pi k - \operatorname{arctg} \frac{1}{2} < x <$   
 $< \pi k + \operatorname{arctg} \frac{1}{2}$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 25.  $-\sqrt{\frac{4-\pi}{\pi}} \leq x \leq \sqrt{\frac{4-\pi}{\pi}}$ . 26.  $\frac{\pi}{4} + 2\pi k < x < -\frac{\pi}{4} +$   
 $+ 2\pi(k+1)$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 27.  $x = \pm \arccos \sqrt{\frac{3}{8}} + \pi n$ ;  $n \in \mathbb{Z}$ . 28.  $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} +$   
 $+ 2(k+1)\pi$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 29.  $2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 30.  $\frac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ;  
 $k \in \mathbb{Z}$ . 31.  $2\left(\pi k + \operatorname{arctg} \frac{3-\sqrt{2}}{7}\right) < x < 2\left(\pi k + \operatorname{arctg} \frac{3+\sqrt{2}}{7}\right)$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 32.  $x = -1$ ,  
 $x = 0$ . 33.  $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$ . 34.  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\left(1 - \frac{\sqrt{35}}{6}\right)\right) < x < \sin\left(\frac{\pi}{4}\left(1 + \frac{\sqrt{35}}{6}\right)\right)$ . 35.  $2k\pi <$   
 $< x < (2k+1)\pi$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 36.  $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . 37.  $-1 \leq x \leq -\frac{7}{8}$ ,  $x = 1$ .  
 38. 2009. 39.  $x \leq \frac{4\pi+18}{5}$ ,  $8\pi - 18 \leq x \leq 18 - 3\pi$ .

### Подготовительные задачи

1. решений нет. 2. решений нет. 3.  $x = \frac{\pi}{14} + \frac{k\pi}{7}$ ,  $x = \pm \frac{\pi}{28} + \frac{2n\pi}{7}$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ .  
 4.  $x = (2k+1)\pi$ ,  $x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + n\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 5.  $x = (2k+1)\pi$ ,  $x = \pm \arccos \frac{3}{4} +$   
 $+ 2n\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 6.  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $x = -\frac{\pi}{3} + n\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 7.  $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ .  
 8.  $x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + n\pi$ ;  $n \in \mathbb{Z}$ . 9.  $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 10.  $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ,  $x = \frac{n\pi}{2}$ ;  
 $k, n \in \mathbb{Z}$ . 11.  $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $x = 2n\pi$ ,  $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 12. Решений  
 нет. 13.  $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ ,  $x = -\operatorname{arctg} 3 + n\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 14.  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $x = 2n\pi$ ;  
 $k, n \in \mathbb{Z}$ . 15.  $x = -\frac{1}{3} + \frac{4k-1}{12}\pi$ ,  $x = -\frac{1}{6} + \frac{4n-1}{24}\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 16.  $n\pi$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

17.  $x = \arccos \frac{4}{5} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ . 18.  $x = -\frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2}, x = \frac{\pi}{12} + n\pi; k, n \in \mathbb{Z}$ . 19.  $x = \arctg \frac{1}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$ . 20.  $x = \frac{3\pi}{4} + k\pi, x = n\pi; k, n \in \mathbb{Z}$ . 21.  $x = -\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + k\pi, x = \arctg \frac{3}{2} + n\pi; k, n \in \mathbb{Z}$ . 22.  $x = \pm \frac{\pi}{2} + \frac{3k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$ . 23.  $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi, x = \frac{\pi}{8} + \frac{n\pi}{4}; k, n \in \mathbb{Z}$ . 24.  $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ . 25.  $x = \pi - \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ . 26.  $\frac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ . 27.  $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ . 28.  $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ . 29.  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . 30.  $x = \pm \frac{\pi}{4} \pm \arccos \frac{\sqrt{2}}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ .

## § 7. Комбинированные уравнения, неравенства и системы

### Тренировочные задачи

1. 2. 2. 1. 3.  $x = \frac{4}{5}, x = \frac{6}{5}$ . 4.  $\frac{3}{4} < x \leq 7$ . 5.  $2 < x \leq 2 + \operatorname{tg} \frac{3\pi}{16}$ . 6.  $x = \frac{1}{3}, x = \frac{2(1-\sqrt{2})}{3}$ . 7.  $x = -\frac{1}{2}, x = \frac{5}{2}$ . 8.  $x = \frac{1}{9}, x = 9$ . 9.  $\left[ -\frac{127}{384}; -\frac{21}{64} \right) \cup \left( -\frac{1}{4}; -\frac{1}{6} \right]$ .
10.  $-77 < x < 3$ . 11.  $-2 < x \leq -\frac{53}{27}$ . 12.  $0 \leq x < 1$ . 13.  $-2 < x < -1, 1 < x < 2$ . 14.  $x < -2$ . 15.  $0 < x \leq 3^{-2\sqrt{3}}, x \geq 3^{2\sqrt{3}}$ . 16.  $\log_3 \frac{9}{10} \leq x < 2$ . 17.  $x < 2$ . 18.  $x > \log_3 10$ . 19.  $0 < x < \frac{1}{2}, 2 < x < 3$ . 20.  $\log_2 \frac{5}{4} < x < \log_2 3$ . 21.  $0 \leq x \leq \frac{27}{16}$ . 22.  $-2\sqrt{2} \leq x < -1, \frac{\sqrt{44}-2}{5} \leq x < 1$ . 23.  $0 < x \leq \frac{1}{\sqrt[3]{2}}, x > 2$ . 24.  $[1; 2]$ . 25.  $0 < x \leq \frac{1}{4}, 1 \leq x < 4$ . 26.  $0 < x \leq \frac{1}{4}, x \geq 4$ . 27.  $1 < x < 1000$ . 28.  $1 < x \leq 5^{\log_2 7} = 7^{\log_2 5}$ . 29.  $x > 3$ . 30.  $3 < x < \frac{7}{2}, x > 4$ . 31.  $-2 \leq x < -\sqrt{2}, 0 \leq x < -1 + \sqrt{2}$ . 32.  $-\frac{1}{3} \leq x < 0, \frac{1}{5} < x < \frac{3-\sqrt{3}}{6}$ . 33.  $x \geq \log_{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{17}}$ . 34.  $-1 \leq x < 7, x = -2$ . 35.  $\frac{3}{2} < x < 2, x > 2$ . 36.  $x < -7, -5 < x \leq -3, x \geq 2$ . 37.  $x < \log_{2+\sqrt{3}}(\sqrt{2}-1)$ . 38.  $2-\sqrt{2} < x \leq 1, 3 \leq x < 2+\sqrt{2}$ . 39.  $x = \frac{1}{1000}, x = 10, x = 100$ . 40.  $x = -\log_3 2, x = \log_3 2$ . 41.  $x = -\frac{1}{2}, x = \frac{1}{2}, x \geq 3$ . 42.  $-1 \leq x \leq 0, 2 \leq x \leq 3$ . 43.  $\frac{1}{4} \leq x \leq 1, 1 < x \leq 4$ . 44.  $0 < x \leq \frac{1}{100}, \frac{1}{10} \leq x \leq 1$ . 45.  $\sqrt{6}-1 \leq x < 2, 2 < x \leq 5$ . 46.  $x \leq -3, x = 5$ . 47.  $x < -2, -2 < x < 2-\sqrt{15}, x \geq 6$ . 48.  $-1 \leq x \leq 0$ . 49.  $0 \leq x \leq 4$ . 50.  $-3 \leq x \leq \frac{8\sqrt{3}-19}{13}, x = 0, \frac{11}{13} \leq x \leq 1$ . 51.  $0 < x < 1, x = 2$ . 52.  $x = 3, x \geq 8$ . 53.  $-1 < x \leq \frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0 < x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}, x \geq \frac{1+\sqrt{13}}{2}$ . 54.  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ . 55.  $x = \log_2 \left( k + \frac{1}{4} \right), k = 0, 1, 2, \dots; x = \log_2 n, n = 1, 2, \dots$ . 56.  $x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + k\pi, x = n\pi; k, n \in \mathbb{Z}$ . 57.  $x = \frac{\pi}{6}$ .

58.  $\frac{\pi}{4} + k\pi < x < \frac{\pi}{3} + k\pi$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 59.  $\arctg 5 + 2k\pi < x < (2k+1)\pi$ ,  $x \neq \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 60.  $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ,  $x \neq \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ ;  $k = 1, \pm 2, \pm 3, \dots, n \in \mathbb{Z}$ ,  $-\frac{11\pi}{6} \leq x < -\frac{3\pi}{2}$ ,  $-\frac{3\pi}{2} < x \leq -4$ ,  $x = -\frac{7\pi}{6}$ . 61.  $x = k\pi$ ,  $y = 1$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 62.  $x = \frac{3}{\pi}$ ,  $y = \frac{\pi}{2} + 2\pi n - \frac{3}{\pi}$ ;  $x = -\frac{3}{\pi}$ ,  $y = \frac{\pi}{2} + 2\pi k + \frac{3}{\pi}$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$

### Подготовительные задачи

1.  $x \leq 0$ ,  $x \geq \frac{7}{8}$ . 2.  $x \leq -2011$ ,  $x \geq 2009$ . 3.  $x < -3$ ,  $x > 3$ . 4.  $-2 < x < -\frac{17}{9}$ ,  $x > 7$ . 5.  $x < 0$ . 6.  $x > 0$ . 7.  $-1 < x < 0$ ,  $x > 1$ . 8.  $-\frac{1}{2} < x < 0$ . 9.  $x > 2$ .
10.  $x \leq \log_3 2$ ,  $1 < x < 5$ . 11.  $x = -2 - \sqrt{10}$ . 12.  $x = \sqrt{10^{1-\sqrt{3}}}$ ,  $x = \sqrt{10^{1+\sqrt{3}}}$ .
13.  $1 < x < 10000$ . 14.  $x > 1000$ . 15.  $0 \leq x < 64$ . 16.  $x = -3$ ,  $x \geq -1$ .
17.  $x \leq \log_2(\sqrt{2}-1)$ ,  $x \geq \frac{1}{2}$ . 18.  $x = 2$ . 19.  $x = 1$ . 20.  $x = \log_3 4$ . 21.  $x = 0$ .
22.  $x = 9$ . 23.  $x = 10$ ,  $x = 10^4$ . 24.  $(-\sqrt{2}-1; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; \sqrt{2}+1)$ . 25.  $0 \leq x \leq \frac{27}{16}$ . 26.  $1 < x < 4$ . 27.  $-1 < x < -\frac{2}{\sqrt{5}}$ ,  $\frac{2}{\sqrt{5}} < x < 1$ . 28.  $0 < x < 10^{\frac{\lg 0,5 + \lg 3}{\lg 1,5}}$ .
29.  $0 < x \leq \frac{1}{4}$ ,  $x \geq 4$ . 30.  $-1 - \sqrt{5} < x < -3$ ,  $\sqrt{5} - 1 < x < 5$ . 31.  $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ ,  $x = \pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2n\pi}{3}$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 32.  $x = \pm \arcsin \frac{\lg 3}{\lg(\sqrt{2} + \sqrt{3})} + k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . 33.  $x = -\frac{5\pi}{3}$ .
34.  $\frac{1}{10} < x \leq 4$ ,  $8 \leq x < 10$ . 35.  $x \leq -1$ ,  $1 < x \leq 2$ . 36.  $-2 \leq x \leq -\frac{3}{2}$ ,  $-1 < x < 1$ ,  $x \geq \frac{7}{2}$ . 37.  $0 < x \leq \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ ,  $\sqrt[3]{3} < x < 2$ ,  $x > 2$ . 38.  $0 < x < 1$ ,  $x = 2$ ,  $x > 3$ . 39.  $\{-2\} \cup (-1; 0) \cup \{1\}$ . 40.  $\{0; 2\} \cup [2, 5; +\infty)$ . 41.  $\left(-\frac{5}{2}; -2\right] \cup \{2\}$ . 42.  $(-1; 0) \cup (0; 0,5] \cup (1; 2]$ . 43.  $x < -1$ ,  $-\frac{1}{3} < x \leq 0$ ,  $x \geq 5$ .

### Диагностическая работа 1

1.  $x < 1$ ,  $\frac{3}{2} < x < 2$ ,  $x > 3$ . 2.  $-5 < x < 1$ ,  $2 < x < 3$ . 3.  $\frac{1}{2} \leq x < 1$ . 4.  $2 \leq x < 3$ .
5.  $-2 \leq x \leq -1$ ,  $x = 3$ . 6.  $-5 \leq x < -4$ ,  $-2 < x \leq -2 + \sqrt{3}$ . 7.  $x = n\pi$ ,  $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ;  $n, k \in \mathbb{Z}$ . 8.  $1 - \sqrt{3} \leq x \leq \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ ,  $2 < x < \frac{5}{2}$ . 9.  $\frac{1}{\sqrt{10}} \leq x < 1$ ,  $1 < x < 4$ ,  $x > 8$ .

### Диагностическая работа 2

1.  $x < -1$ ,  $x > 4$ . 2.  $x \leq -2$ ,  $-1 < x < 4$ . 3.  $2 \leq x < 3$ . 4.  $\frac{3 - \sqrt{5}}{2} < x < \frac{1}{2}$ ,  $1 < x < \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ . 5.  $x < -6$ ,  $-4 < x \leq -2$ ,  $x \geq 3$ . 6.  $\frac{2}{3} \leq x \leq 1$ ,  $x > 2$ . 7.  $x = n\pi$ ,  $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ;  $n, k \in \mathbb{Z}$ . 8.  $\frac{1}{10} < x \leq \frac{1}{2}$ . 9.  $1 < x \leq 4$ ,  $8 \leq x < 10^4$ .

**Диагностическая работа 3**

1.  $-4 < x \leq -1$ ,  $-\frac{2}{3} < x \leq 1$ . 2.  $x < -2$ ,  $-1 < x < 3$ ,  $4 < x$ . 3.  $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ .  
 4.  $x < -3$ ,  $-1 + \sqrt{3} < x < 1$ . 5.  $-3 < x < 0$ ,  $x = \frac{1}{2}$ ,  $x = 2$ . 6.  $x < -1$ ,  $-1 < x < 1$ ,  
 $x > 1$ . 7.  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ . 8.  $-\frac{1}{2} < x < 0$ . 9.  $0 < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $\sqrt{3} < x \leq 4$ ,  $x \geq 8$ .

**Диагностическая работа 4**

1.  $-\frac{3}{2} < x < -\frac{4}{3}$ ,  $-1 < x < 1$ . 2.  $x < -7$ ,  $-4 < x < -2$ . 3.  $-2 \leq x < -1$ ,  $x \geq 1$ .  
 4.  $-2 < x < -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ . 5.  $x < 0$ ,  $1 \leq x \leq 2$ . 6.  $x < \frac{1}{3}$ . 7.  $x = (-1)^k \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ .  
 8.  $-4 < x < -1$ . 9.  $-2 < x < -1$ ,  $-1 < x < -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $\frac{1}{\sqrt{2}} < x < 1$ ,  $x \geq 2$ .

**Диагностическая работа 5**

1.  $1 < x \leq 2$ ,  $7 < x < 8$ . 2.  $-4 \leq x < -3$ ,  $-\frac{3}{2} \leq x < 0$ ,  $x \geq 1$ . 3.  $x \leq -3$ ,  $x = 5$ .  
 4.  $-5 < x < -2 - 2\sqrt{2}$ ,  $-4 \leq x < 0$ ,  $0 < x < \frac{1}{2}$ . 5. 6.  $x \leq 0$ ,  $1 \leq x \leq 2$ ,  $x \geq 5$ .  
 7.  $x = (2k+1)\pi$ ,  $x = \pi + \arccos \frac{1}{\sqrt{5}} - \arcsin \frac{1}{\sqrt{5}} + 2n\pi$ ;  $k, n \in \mathbb{Z}$ . 8.  $x = 2 +$   
 $+ \sqrt{14 + 4\sqrt{3}}$ ,  $x = 2 - \sqrt{14 + 4\sqrt{3}}$ . 9.  $0 < x \leq \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ ,  $\sqrt[3]{3} < x < 2$ ,  $x > 2$ .

**Диагностическая работа 6**

1.  $x = \frac{1}{2}$ ,  $x = 2$ . 2.  $x = -\frac{2}{3}$ ,  $x = 2$ . 3.  $-\sqrt{2+\sqrt{3}} < x < -\sqrt{\frac{2}{3}}$ ,  $-\sqrt{2-\sqrt{3}} < x < 0$ ,  
 $0 < x < \sqrt{2-\sqrt{3}}$ ,  $\sqrt{\frac{2}{3}} < x < \sqrt{2+\sqrt{3}}$ . 4.  $-\frac{1}{2} < x < \frac{-5-\sqrt{5}}{20}$ ,  $\frac{-5+\sqrt{5}}{20} < x < 0$ ,  
 $0 < x < \frac{-5+\sqrt{45}}{20}$ ,  $\frac{-3+\sqrt{44}}{10} \leq x < \frac{1}{2}$ . 5.  $x > 0$ . 6.  $x \leq -2 - \sqrt{3}$ ,  $-0,3 < x <$   
 $< -2 + \sqrt{3}$ ,  $x = 1$ ,  $x > 2$ . 7.  $\frac{2\pi}{3} < x \leq 2 \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{21}-1}{2}$ . 8.  $x \leq -2$ ,  $0 \leq x <$   
 $< \lg 101 - 2$ . 9.  $(-1; 0) \cup (0; 0,5] \cup (1; 2]$ .

## **Содержание**

Предисловие . . . . .	3
Введение . . . . .	5
Диагностическая работа . . . . .	8
§ 1. Рациональные уравнения и неравенства . . . . .	10
Тренировочные задачи . . . . .	13
Подготовительные задачи . . . . .	14
§ 2. Показательные уравнения и неравенства . . . . .	15
Тренировочные задачи . . . . .	18
Подготовительные задачи . . . . .	20
§ 3. Логарифмические уравнения и неравенства . . . . .	21
Тренировочные задачи . . . . .	25
Подготовительные задачи . . . . .	27
§ 4. Иррациональные уравнения и неравенства . . . . .	29
Тренировочные задачи . . . . .	33
Подготовительные задачи . . . . .	35
§ 5. Уравнения и неравенства с модулем . . . . .	36
Тренировочные задачи . . . . .	40
Подготовительные задачи . . . . .	41
§ 6. Тригонометрические уравнения и неравенства . . . . .	42
Тренировочные задачи . . . . .	46
Подготовительные задачи . . . . .	48
§ 7. Комбинированные уравнения, неравенства и системы . . . . .	50
Тренировочные задачи . . . . .	55
Подготовительные задачи . . . . .	58
Диагностическая работа 1 . . . . .	61
Диагностическая работа 2 . . . . .	62
Диагностическая работа 3 . . . . .	63
Диагностическая работа 4 . . . . .	64

Диагностическая работа 5 . . . . .	65
Диагностическая работа 6 . . . . .	66
Рекомендуемая литература . . . . .	67
Ответы . . . . .	69

*Сергеев Игорь Николаевич  
Панфёров Валерий Семёнович*

**ЕГЭ 2013. МАТЕМАТИКА. ЗАДАЧА С3. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА**

Под редакцией А. Л. Семенова и И. В. Ященко

Подписано в печать 30.07.2012 г. Формат 60 × 90 ½. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Печ. л. 5. Тираж 10 000 экз. Заказ № 4816.

Издательство Московского центра  
непрерывного математического образования.

119002, Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел. (499) 241-74-83

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «Дом печати — ВЯТКА»

в полном соответствии с качеством предоставленных оригиналов.

610033, г. Киров, ул. Московская, 122. Факс (8332) 53-53-80, 62-10-36.

<http://www.gipp.kirov.ru> e-mail: [order@gipp.kirov.ru](mailto:order@gipp.kirov.ru)

---

Книги издательства МЦНМО можно приобрести в магазине «Математическая книга»,  
Большой Власьевский пер., д. 11. Тел. (499) 241-72-85. E-mail: [biblio@mccme.ru](mailto:biblio@mccme.ru)

